Декспантенол-Хемофарм



Код АТХ:

- D03AX03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декспантенол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения 5%*** гомогенная, от белого до светло-желтого цвета.

	1 г
декспантенол	50 мг

Вспомогательные вещества: глицерол, вазелин, ланолин, парафин жидкий, парафин твердый, стеариловый спирт, цетиловый спирт, вода.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Декспантенол - производное пантотеновой кислоты. Декспантенол переходит в организме в пантотеновую кислоту, которая является составной частью кофермента А и участвует в процессах ацетилирования, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов.

Кроме того, принимает участие практически во всех метаболических процессах (цикл трикарбоновых кислот, обмен углеводов, жиров и жирных кислот, фосфолипидов, белков), стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

При местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с

белками плазмы (главным образом, с бета-глобулином и альбумином). Концентрация в крови - 0.5-1 мг/л, в сыворотке крови - 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в Ко-А), выводится в неизмененном виде.

Показания к применению:

— сухость кожи;

— нарушение целостности кожных покровов и мягких тканей;

— мелкие повреждения;

— ожоги (термические и солнечные);

— ссадины;

— буллезный дерматит;

— абсцесс;

— фурункул;

— трофические язвы голени;

— пролежни;

— трещины;

— асептические послеоперационные раны;

— плохо приживающиеся кожные трансплантаты;

— лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы в период лактации;

— уход за грудными детьми;

— профилактика и лечение опрелости;

— заживление кожи при мелких повреждениях;

— эритемы от пеленок у грудных детей.

Относится к болезням:

- Абсцесс
- Воспаление
- Дерматит
- Ожоги
- Пролежни
- Раны
- Ссадины
- Фурункул
- Эритема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Для *лечения ран, опрелостей, нарывов, пролежней, дерматитов, для ухода за грудью, грудными детьми* - 5% мазь 2-3 раза/сут наносят на пораженную поверхность тонким слоем и слегка втирают в зависимости от показания; на область соска молочной железы мазь накладывают в виде компресса после каждого кормления грудью.

Грудным детям Декспантенол наносят на спину, ягодицы и паховую область после каждой смены белья или водной

процедуры.

Побочное действие:

Возможно возникновение аллергических реакций, при их появлении прекратить применение препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Может применяться во время беременности и в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение плохо заживающих кожных трансплантантов и трофических язв должно проводиться под наблюдением лечащего врача.

Не наносить на мокнущие раны.

Применение в детском возрасте

Для *лечения ран, опрелостей, нарывов, пролежней, дерматитов грудными детьми* - 5% мазь 2-3 раза/сут наносят на пораженную поверхность тонким слоем и слегка втирают в зависимости от показания.

Грудным детям Декспантенол наносят на спину, ягодицы и паховую область после каждой смены белья или водной процедуры.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15° до 25°С . Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dekspantenol-Hemofarm