

[Декспантенол \(мазь\)](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 5%** светло-желтого цвета, однородная, с характерным запахом ланолина.

	1 г
декспантенол	50 мг

Вспомогательные вещества: вазелин, вазелин белый, холестерин, масло вазелиновое, изопропилмиристант, метилпарагидроксibenзоат (нипагин), пропилпарагидроксibenзоат (нипазол), вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Декспантенол – производное пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота – водорастворимый витамин группы В – является составной частью кофермента А. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Повышение потребности в пантотеновой кислоте наблюдается при повреждении кожного покрова или тканей, а ее недостаток можно восполнить местным применением декспантенола. Оптимальная молекулярная масса, гидрофильность и низкая полярность делают возможным его проникновение во все слои кожи. Оказывает регенерирующее, слабое противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

При местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином).

Показания к применению:

— нарушения целостности кожного покрова, вызванные механическими, химическими, температурными факторами или после хирургических вмешательств (ожоги различного происхождения (в т.ч. солнечные); царапины, ссадины, раны; пролежни; плохо заживающие кожные трансплантаты; асептические послеоперационные раны);

— воспалительные процессы на коже; дерматиты; фурункулы; трофические язвы нижних конечностей; уход за кожей вокруг трахеостом, гастростом и колостом;

— лечение и профилактика последствий неблагоприятного воздействия на кожу факторов внешней среды (холода, ветра, сырости);

— у детей – пеленочный дерматит, царапины и незначительное раздражение после воздействия солнца, ультрафиолетового и рентгеновского облучения; лечение и профилактика опрелостей;

— трещины и воспаления сосков молочной железы у кормящих матерей;

— для обработки и защиты сухой кожи как источник нейтральных жиров и декспантенола.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Гастрит](#)
- [Дерматит](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Трахеит](#)
- [Фурункул](#)
- [Царапины](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят 2-4 раза/сут (при необходимости чаще). Наносится тонким слоем на пораженный участок кожи, слегка втирая. В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи, ее следует предварительно обработать любым антисептиком.

Кормящим матерям смазывать поверхность соска мазью после каждого кормления грудью.

Грудным детям наносят мазь после каждой смены белья или водной процедуры.

Побочное действие:

Побочные явления развиваются исключительно редко. Возможны незначительно выраженные аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Осторожно по показаниям:

— трещины и воспаления сосков молочной железы у кормящих матерей.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение трофических язв и плохо заживающих кожных трансплантатов должно проводиться под наблюдением лечащего врача.

Не наносить на мокнущие раны.

Применение в детском возрасте

По показаниям:

— пеленочный дерматит, царапины и незначительное раздражение после воздействия солнца, ультрафиолетового и рентгеновского облучения; лечение и профилактика опрелостей.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dekspantenol_maz