

## Депантол



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)
- [Хлоргексидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения** белого или почти белого цвета.

	<b>1 г</b>
декспантенол	52.5 мг
хлоргексидина биглюконат (в форме 20% р-ра)	8.02 мг

*Вспомогательные вещества:* пропиленгликоль - 100 мг, макрогола цетостеарат (Eumulgin B2) - 16 мг, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт не более 60%, стеариловый спирт не менее 40%) (Lanette O) - 54 мг, парафин жидкий (масло вазелиновое медицинское) - 100 мг, вазелин - 100 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 0.2 мг, калия дигидрофосфат - 7.8 мг, вода очищенная - до 1 г.

25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаратанты](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей, с противомикробной активностью для наружного применения.

Декспантенол - витамин группы В, в организме метаболизируется в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, ГКС, порфиринов. Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, витаминное, метаболическое и противовоспалительное действие.

Хлоргексидин - противомикробный препарат, антисептик.

## Депантол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus spp., а также дрожжеподобных грибов и дерматофитов.

Сохраняет активность в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ. Крем Депантол защищает поверхность раны от инфицирования, подавляет течение инфекционного процесса и ускоряет заживление.

### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

## Показания к применению:

— обработка ран при опасности инфицирования (в т.ч. ссадины, порезы, царапины, трещины, расчесы, укусы насекомых, ожоги, трофические язвы);

— обработка послеоперационных ран;

— лечение инфицированных ран, ожогов (в т.ч. солнечных), пролежней, ссадин, порезов, трещин, трофических язв, опрелостей;

— лечение инфицированных дерматозов (в т.ч. экзема и атопический дерматит).

— пеленочный дерматит, царапины с признаками инфицирования у детей;

— трещины и воспаление сосков молочных желез с признаками инфицирования у кормящих матерей.

## Относится к болезням:

- [Атопический дерматоз](#)
- [Воспаление](#)
- [Дерматит](#)
- [Ожоги](#)
- [Порезы](#)
- [Пролежни](#)
- [Ссадины](#)
- [Царапины](#)
- [Экзема](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Крем следует наносить тонким слоем на пораженный участок кожи 1 или несколько раз/сут по показаниям.

Кормящим матерям рекомендуется смазывать кремом инфицированную поверхность соска после кормления грудью.

Грудным детям крем наносят на места инфицирования после смены белья или водной процедуры.

## Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период лактации следует избегать применения препарата на обширных участках.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Хлоргексидин несовместим с мылом и другими анионными веществами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не следует допускать попадания крема в глаза.

### ***Применение в детском возрасте***

Возможно применение по показаниям.

## **Условия хранения:**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Depantol>