

[Депантол \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [D08AC52](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декспантенол](#)
- [Хлоргексидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суппозитории вагинальные** белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы; допускается мраморность поверхности.

	1 супп.
декспантенол	100 мг
хлоргексидина биглюконат (в форме 20% раствора)	16 мг

Вспомогательные вещества: основа для суппозитория (макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) - 92-98%, макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) - 8-2%) - достаточное количество до получения суппозитория массой 3 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаратанты](#)

Фармакологические свойства:

Депантол (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии, оказывающий регенерирующее, противомикробное, метаболическое действие.

Хлоргексидин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.; дрожжей, дерматофитов, простейших (*Trichomonas vaginalis*). К хлоргексидину слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий.

Декспантенол стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Депантол не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

- острые и хронические вагиниты;
- эндо/экзоцервициты (в т.ч. осложненные эктопией шейки матки);
- истинная эрозия шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии);
- для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктивных методов лечения (в т.ч. диатермокоагуляция, криодеструкция, лазеродеструкция), в послеоперационном и послеродовом периодах.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Диатез](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Депантол применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки.

Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, зуд, жжение (проходящие после отмены препарата).

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Депантол (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение Депантола при беременности и в период лактации разрешено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Депантол несовместим с детергентами, содержащими анионную группу (в т.ч. сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Depantol_svechi