# Депантол (свечи)




## Код АТХ:

- D08AC52

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декспантенол
- Хлоргексидин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории вагинальные*** белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы; допускается мраморность поверхности.

| | **1 супп.** |
|---|---|
| декспантенол | 100 мг |
| хлоргексидина биглюконат (в форме 20% раствора) | 16 мг |

*Вспомогательные вещества:* основа для суппозиториев (макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) - 92-98%, макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) - 8-2%) - достаточное количество до получения суппозитория массой 3 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Регенеранты и репаранты

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии, оказывающий регенерирующее, противомикробное, метаболическое действие.

*Хлоргексидин* активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Treponema pallidum, Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; дрожжей, дерматофитов, простейших (Trichomonas vaginalis). К хлоргексидину слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий.

*Декспантенол* стимулирует регенерацию слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Депантол не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

***Фармакокинетика***

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

## Показания к применению:

— острые и хронические вагиниты;

— эндо/экзоцервициты (в т.ч. осложненные эктопией шейки матки);

— истинная эрозия шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии);

— для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктивных методов лечения (в т.ч. диатермокоагуляция, криодеструкция, лазеродеструкция), в послеоперационном и послеродовом периодах.

## Относится к болезням:

- Вагинит
- Диатез

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Депантол применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки.

Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

## Побочное действие:

*Возможны* аллергические реакции, зуд, жжение (проходящие после отмены препарата).

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Депантола при беременности и в период лактации разрешено.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Депантол несовместим с детергентами, содержащими анионную группу (в т.ч. сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Depantol_svechi