Депостат



Код АТХ:

- G03DA01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гестонорона капроат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противоопухолевые средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гестаген, депо-форма. Структурно близок к прогестерону.

Показания к применению:

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (при необходимости консервативной терапии); прогрессирующий рак эндометрия, молочной железы.

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы
- Эндометрит

Противопоказания:

Злокачественные опухоли печени (если они не вызваны метастазами опухолей эндометрия или молочной железы), в т.ч. в анамнезе; заболевания печени; беременность, лактация; герпес беременных в анамнезе.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, стадии заболевания, схемы терапии.

Побочное действие:

Редко: во время или после окончания слишком быстрого введения - непродолжительное кашлевое раздражение, приступ кашля; одышка, нарушение кровообращения; гиперкальциемия. У мужчин - гинекомастия, нарушение потенции, обратимое уменьшение сперматогенеза.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, лактации, герпесе беременных в анамнезе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении гестагенов с карбамазепином, гризеофульвином, фенобарбиталом, фенитоином, рифампицином возможно повышение клиренса гестагенов.

Гестагены могут ингибировать метаболизм циклоспорина, что приводит увеличению его концентрации в плазме крови и повышению токсичности.

Особые указания и меры предосторожности:

Если при лечении рака молочной железы или эндометрия развивается гиперкальциемия, то терапию необходимо прекратить. С осторожностью применяют при следующих сопутствующих заболеваниях: бронхиальная астма, сахарный диабет, эпилепсия, мигрень, выраженные нарушения функции печени.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при злокачественных опухолях печени (если они не вызваны метастазами опухолей эндометрия или молочной железы), в т.ч. в анамнезе; при заболеваниях печени. С осторожностью применяют при выраженных нарушениях функции печени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Depostat