

## Депостат



### **Код АТХ:**

- [G03DA01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Гестонорона капроат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противоопухолевые средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Гестаген, депо-форма. Структурно близок к прогестерону.

### **Показания к применению:**

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (при необходимости консервативной терапии); прогрессирующий рак эндометрия, молочной железы.

### **Относится к болезням:**

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Эндометрит](#)

### **Противопоказания:**

Злокачественные опухоли печени (если они не вызваны метастазами опухолей эндометрия или молочной железы), в т.ч. в анамнезе; заболевания печени; беременность, лактация; герпес беременных в анамнезе.

### **Способ применения и дозы:**

Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, стадии заболевания, схемы терапии.

### **Побочное действие:**

*Редко:* во время или после окончания слишком быстрого введения - непродолжительное кашлевое раздражение, приступ кашля; одышка, нарушение кровообращения; гиперкальциемия. У мужчин - гинекомастия, нарушение потенции, обратимое уменьшение сперматогенеза.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности, лактации, герпесе беременных в анамнезе.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении гестагенов с карбамазепином, гризеофульвином, фенobarбиталом, фенитоином, рифампицином возможно повышение клиренса гестагенов.

Гестагены могут ингибировать метаболизм циклоспорина, что приводит к увеличению его концентрации в плазме крови и повышению токсичности.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Если при лечении рака молочной железы или эндометрия развивается гиперкальциемия, то терапию необходимо прекратить. С осторожностью применяют при следующих сопутствующих заболеваниях: бронхиальная астма, сахарный диабет, эпилепсия, мигрень, выраженные нарушения функции печени.

#### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при злокачественных опухолях печени (если они не вызваны метастазами опухолей эндометрия или молочной железы), в т.ч. в анамнезе; при заболеваниях печени. С осторожностью применяют при выраженных нарушениях функции печени.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Depostat>