# Деситин



## Код АТХ:

- D02AB

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Цинка оксид

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Мазь для наружного применения 40%*** белого цвета, с небольшим зернением, вязкая, с характерным запахом масла печени трески.

| | **1 г** |
|---|---|
| цинка оксид | 400 мг |

*Вспомогательные вещества:* ланолин безводный, вазелин белый, масло печени трески, гидроксианизол бутилированный, тальк, масло ароматизированное, метилпарабен, вода.

57 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат с противовоспалительными свойствами для наружного применения. Предупреждает развитие пеленочного дерматита, защищает кожу от раздражающего действия мочи и других веществ, смягчает кожу.

Свойства препарата обусловлены эффектами его компонентов. Цинка оксид, масло печени трески в сочетании с вазелино-ланолиновой основой мази создают физический барьер, образуя защитное покрытие на коже или слизистых оболочках, уменьшающее воздействие раздражающих веществ на пораженную область и предупреждает появление сыпи. Деситин дает заметный эффект при пеленочной сыпи в течение 24 ч после начала применения.

Деситин обеспечивает продолжительный защитный эффект от влаги, особенно в ночное время, когда ребенок может находиться в мокрых пеленках.

Оказывает также слабое вяжущее действие, поэтому его применяют в качестве противовоспалительного и защитного средства при небольших ожогах, порезах, царапинах, а также при экземе и поражениях кожи легкой степени.

***Фармакокинетика***

Данные по фармакокинетике препарата Деситин не предоставлены.

## Показания к применению:

— лечение и профилактика пеленочной сыпи;

— в качестве средства оказания первой помощи при легких повреждения кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины и солнечные ожоги).

## Относится к болезням:

- Ожоги
- Порезы
- Царапины

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат предназначен только для наружного применения.

Для *лечения пеленочной сыпи* у **детей** (начиная с грудного возраста) при появлении первых признаков покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи мазь наносят 3 или более раз в сутки по необходимости. Как правило, мазь наносят на вымытую и высушенную пораженную область при любой смене пеленок.

Для *профилактики пеленочной сыпи* препарат наносят на кожу, покрываемую пеленкой или памперсом до появления признаков раздражения, особенно перед сном, когда ребенок может долгое время находиться в мокрых пеленках.

При *порезах, небольших ожогах, царапинах и солнечных ожогах* препарат наносят тонким слоем только на поверхностные и неинфицированные поражения. При необходимости применяют марлевые повязки.

## Побочное действие:

Побочное действие препарата Деситин не описано.

## Передозировка:

Передозировка препарата Деситин не описана.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Деситин не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не следует допускать попадания мази в глаза. Если при применении препарата сыпь не исчезает в течение 48-72 ч, то следует заново оценить клиническую ситуацию.

Мазь не следует наносить при инфицированности поврежденных участков кожи.

***Применение в детском возрасте***

Для *лечения пеленочной сыпи* у **детей** (начиная с грудного возраста) при появлении первых признаков покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи мазь наносят 3 или более раз в сутки по необходимости. Как правило, мазь наносят на вымытую и высушенную пораженную область при любой смене пеленок.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности – 3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Desitin