


## Детралекс (суспензия)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

## Детралекс (суспензия)



### Код АТХ:

- [C05CA53](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Очищенная микронизированная флавоноидная фракция \(диосмин\)](#)
- [флавоноиды в пересчете на гесперидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

По 15 таблеток в блистере (ПВХ/Ал). По 2 или 4 блистера с инструкцией по медицинскому применению в пачке картонной.

При расфасовке (упаковке)/производстве на российском предприятии ООО «Сердикс»

По 15 таблеток в блистере (ПВХ/Ал). По 2 или 4 блистера с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную.

### Состав:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	1 табл.
активное вещество:	
очищенная микронизированная флавоноидная фракция,	500 мг

## Детралекс (суспензия)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

состоящая из диосмина 450 мг (90%) и флавоноидов	
в пересчете на гесперидин — 50 мг (10%)	
<i>вспомогательные вещества:</i> желатин — 31,00 мг; магния стеарат — 4,00 мг; МКЦ — 62,00 мг; карбоксиметилкрахмал натрия — 27,00 мг, тальк — 6,00 мг; вода очищенная — 20,00 мг	
<i>оболочка пленочная:</i> макрогол 6000 — 0,710 мг; натрия лаурилсульфат — 0,033 мг, премикс для пленочной оболочки оранжево-розового цвета (в состав входят: глицерол — 0,415 мг; магния стеарат — 0,415 мг, гипромеллоза — 6,886 мг; краситель железа оксид желтый — 0,161 мг; краситель железа оксид красный — 0,054 мг; титана диоксид — 1,326 мг)	

### Описание:

Овальные таблетки, покрытые пленочной оболочкой, оранжево-розового цвета.

*Вид таблетки на изломе:* от бледно-желтого до желтого цвета неоднородной структуры.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — венопротективное, венотонизирующее.

#### Фармакодинамика

Детралекс® обладает венотонизирующим и ангиопротективным свойствами.

Препарат уменьшает растяжимость вен и венозный застой, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность. Результаты клинических исследований подтверждают фармакологическую активность препарата в отношении показателей венозной гемодинамики.

Статистически достоверный дозозависимый эффект препарата Детралекс® был продемонстрирован для следующих венозных плетизмографических параметров: венозной емкости, венозной растяжимости, времени венозного опорожнения. Оптимальное соотношение доза/эффект наблюдается при приеме 2 табл.

Детралекс® повышает венозный тонус: с помощью венозной окклюзионной плетизмографии было показано уменьшение времени венозного опорожнения. У пациентов с признаками выраженного нарушения микроциркуляции отмечается (статистически достоверное), по сравнению с плацебо, повышение капиллярной резистентности, оцененной методом ангиостереометрии, после терапии препаратом Детралекс®.

Доказана терапевтическая эффективность препарата Детралекс® при лечении хронических заболеваний вен нижних конечностей, а также при лечении геморроя.

#### Фармакокинетика

Основное выведение препарата происходит с калом. С мочой, в среднем, выводится около 14% принятого количества препарата.  $T_{1/2}$  составляет 11 ч.

Препарат подвергается активному метаболизму, что подтверждается присутствием феноловых кислот в моче.

### Показания к применению:

Детралекс показан для терапии симптомов хронических заболеваний вен (устранения и облегчения симптомов).

Терапия симптомов венозно-лимфатической недостаточности:

— боль;

## Детралекс (суспензия)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- судороги нижних конечностей;
- ощущение тяжести и распирания в ногах;
- "усталость" ног.

Терапия проявлений венозно-лимфатической недостаточности:

- отеки нижних конечностей;
- трофические изменения кожи и подкожной клетчатки;
- венозные трофические язвы.

Симптоматическая терапия острого и хронического геморроя.

### Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Отеки](#)
- [Судороги](#)
- [Трофические язвы](#)

### Противопоказания:

- повышенная чувствительность к действующему веществу или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата;
- непереносимость фруктозы.

Не рекомендуется прием препарата кормящим женщинам.

### Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь.

Рекомендуемая доза при *венозно-лимфатической недостаточности* - 1000 мг (содержимое 1 саше)/сут, предпочтительно утром, во время приема пищи.

Продолжительность курса лечения может составлять несколько месяцев (вплоть до 12 мес). В случае повторного возникновения симптомов, по рекомендации врача, курс лечения может быть повторен.

Рекомендуемая доза при *остром геморрое* - 3000 мг/сут (по 1000 мг (содержимое 1 саше) утром, днем и вечером) в течение 4 дней, затем - по 2000 мг/сут (по 1000 мг (содержимое 1 саше) утром и вечером) в течение последующих 3 дней.

Рекомендуемая доза при *хроническом геморрое* - 1000 мг (содержимое 1 саше)/сут в любое удобное время дня вместе с приемом пищи.

### Побочное действие:

Побочные эффекты препарата Детралекс, наблюдаемые в ходе клинических исследований, были легкой степени выраженности. Преимущественно отмечались нарушения со стороны ЖКТ (диарея, диспепсия, тошнота, рвота).

Во время приема препарата Детралекс сообщалось о следующих побочных эффектах в виде следующей градации: очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/10 000, <1/1000), крайне редко (<1/10 000), неуточненной частоты (частота не может быть подсчитана по доступным данным).

*Со стороны ЦНС:* редко - головокружение, головная боль, общее недомогание.

*Со стороны ЖКТ:* часто - диарея, диспепсия, тошнота, рвота; нечасто - колит; неуточненной частоты - боль в животе.

*Со стороны кожных покровов:* редко - кожная сыпь, кожный зуд, крапивница; неуточненной частоты - изолированный отек лица, губ, век; в исключительных случаях - ангионевротический отек.

Пациенту следует информировать врача о появлении любых, в т.ч. не упомянутых в инструкции, нежелательных

реакций и ощущений, а также об изменениях лабораторных показателей на фоне терапии.

## **Передозировка:**

Случаев передозировки не описано.

При передозировке препарата пациент должен немедленно обратиться за медицинской помощью.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Диагнозы

- Абсцесс прямой кишки
- Анальная трещина
- Полипы прямой кишки

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Детралекс не отмечалось.

Пациенту следует проинформировать лечащего врача обо всех принимаемых лекарственных препаратах.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед началом применения препарата Детралекс пациенту рекомендуется проконсультироваться с врачом.

При обострении геморроя назначение препарата Детралекс не заменяет специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать сроки, указанные в разделе "Режим дозирования". В том случае, если симптомы не исчезают после рекомендуемого курса терапии, следует пройти осмотр у проктолога, который подберет дальнейшую терапию.

При наличии нарушений венозного кровообращения максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием терапии со здоровым (сбалансированным) образом жизни; желательно избегать долгого пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, а также рекомендуется снижение избыточной массы тела. Пешие прогулки и, в некоторых случаях, ношение специальных чулок (компрессионного трикотажа) способствует улучшению циркуляции крови.

Пациент должен незамедлительно обратиться к врачу, если состояние ухудшилось или в процессе лечения улучшения не наступило.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие высокой скорости психических и физических реакций.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступных для детей местах при температуре не выше 30°C. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

## **Детралекс (суспензия)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Detrareks\\_suspenziya](http://drugs.thead.ru/Detrareks_suspenziya)