

## Детравенол



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◊ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** от розового до бледно-розового цвета, овальные, двояковыпуклые, с риской с одной стороны; на поперечном разрезе видны два слоя: ядро - от серо-коричневого до серо-желтого цвета с вкраплениями более светлого и более темного оттенков и пленочной оболочки.

	<b>1 таб.</b>
гесперидин	50 мг
диосмин	450 мг

Вспомогательные вещества: желатин - 13.5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 27 мг, магния стеарат - 6.5 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 650 мг.

**Состав пленочной оболочки :** опадрай II 85F240012 Розовый - 20 мг: поливиниловый спирт - 8 мг, макрогол-3350 - 4.876 мг, краситель железа оксид красный - 0.08 мг, краситель железа оксид желтый - 0.044 мг, тальк - 2.96 мг, титана диоксид - 4.04 мг.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.  
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.  
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.  
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.  
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (12) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.  
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (12) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.  
15 шт. - упаковки ячейковые контурные (12) - пачки картонные.  
10 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.  
20 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.

30 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.  
40 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.  
50 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.  
60 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.  
90 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.  
100 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.

## **Фармакологические свойства:**

### **Фармакодинамика**

Комбинированное средство с ангиопротекторным и венотонизирующим действием, содержит биофлавоноиды. Уменьшает растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает венозный застой; снижает проницаемость, ломкость капилляров и увеличивает их резистентность; улучшает микроциркуляцию и лимфоотток.

При систематическом применении уменьшает выраженность клинических проявлений хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной природы.

## **Показания к применению:**

Симптоматическая терапия венозной недостаточности нижних конечностей: ощущение тяжести и боль в ногах.

Симптоматическая терапия острого геморроя.

## **Относится к болезням:**

- [Венозная недостаточность](#)
- [Геморрой](#)

## **Противопоказания:**

Период лактации (грудного вскармливания), повышенная чувствительность к диосмину и гесперидину.

## **Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь.

При венозно-лимфатической недостаточности суточная доза составляет 900 мг диосмина + 100 мг гесперидина. Кратность приема – 2 раза/сут (в середине дня и вечером во время приема пищи).

При остром геморрое в течение первых 4 дней суточная доза составляет – 2.7 г диосмина + 300 мг гесперидина (в 2 приема утром и вечером), в течение последующих 3 дней суточная доза составляет 1.8 г диосмина + 200 мг гесперидина (в 2 приема утром и вечером).

## **Побочное действие:**

Диагнозы

- Тромбоз глубоких вен
- Тромбофлебит
- Трофическая язва голени, стопы

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

До настоящего времени не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении данной комбинации у беременных женщин. В экспериментальных исследованиях не наблюдалось тератогенных эффектов комбинации

диосмин+гесперидин.

Противопоказано применение в период лактации (грудного вскармливания), т.к. неизвестно, выделяются ли диосмин и гесперидин с грудным молоком.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При обострении геморроя применение данной комбинации не заменяет специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать рекомендуемые сроки. В том случае, если симптомы не исчезают после короткой терапии, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть проводимую терапию.

При наличии нарушений венозного кровообращения максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием со здоровым, хорошо сбалансированным стилем жизни, при котором желательно избегать долгого пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, а также снизить избыточную массу тела, совершать пешие прогулки и в некоторых случаях - носить специальные чулки, улучшающие циркуляцию крови.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Detravenol>