

## [Девясила Корневищ И Корней Брикет](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Девясила корневища и корни](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство растительного происхождения. Оказывает отхаркивающий и муколитический эффекты, которые связаны с наличием сапонинов, эфирного масла (до 4.3%) и слизи. Усиливает потоотделение, обладает жаропонижающими свойствами, проявляет бактерицидный, фунгицидный, противовирусный эффекты. Сесквитерпеновые лактоны (в т.ч. алантолактон, изоалантолактон) вызывают усиление микроциркуляции в слизистой оболочке желудка, стимулируют продукцию мукополисахаридов защитной слизи, ускоряют процесс заживления язв, обладают гепатопротекторным действием, оказывает желчегонный эффект. Гастропротекторное действие обусловлено способностью нейтрализовать избыток хлористоводородной кислоты и спазмолитическим действием.

Девясил богат инулином (до 44%). Фруктоза, образующаяся при его гидролизе, усваивается по инсулиннезависимому механизму, что способствует оптимизации углеводного обмена, особенно при гипоксии и сахарном диабете. Галеновые препараты девясила проявляют умеренно выраженный, но длительный антигипоксический эффект, который связан с инулином, сапонинами, органическими кислотами, селеном и витамином E.

### **Показания к применению:**

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, сопровождающиеся упорным кашлем с образованием густой вязкой мокроты; гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дискинезия ЖКТ, холецистит, дисбактериоз, ферментопатии; невротические состояния с выраженной астенизацией, невротическая анорексия, диспепсия при беременности; сахарный диабет; дерматиты, раны, трофические язвы.

### **Относится к болезням:**

- [Астения](#)
- [Гастрит](#)

- [Дерматит](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Диспепсия](#)
- [Инфекции](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Раны](#)
- [Сахарный диабет](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

## **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к девясила корневищу.

## **Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь в виде приготовленного отвара по 15-50 мл 3-6 раз/сут за 15-30 мин до еды, а при заболеваниях органов дыхания в теплом виде после еды. При диабете применяют приготовленный холодный настой по 50-100 мл 2-3 раза/сут.

В виде готовой лекарственной формы применяется в соответствующих дозах.

## **Побочное действие:**

*В отдельных случаях:* в первые дни приема - усиление изжоги и боли в животе.

*Редко:* кожный зуд.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Не рекомендуется применение при беременности.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Изжога и боли в животе, которые могут усилиться на фоне приема девясила, исчезают без прекращения лечения.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Devyasila\\_Kornevishch\\_I\\_Korney\\_Briket](http://drugs.thead.ru/Devyasila_Kornevishch_I_Korney_Briket)