

## [Дгк Континус](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Опиоидный анальгетик и противокашлевое средство центрального действия. Основные эффекты дигидрокодеина обусловлены взаимодействием с опиоидными рецепторами. Выраженность анальгезирующего действия оценивается как умеренная - уступает морфину, но превосходит кодеин. При приеме внутрь продолжительность действия 4-5 ч.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь  $C_{max}$  достигается через 1.2-1.8 ч. Биодоступность составляет около 20%, вероятно, в связи с эффектом "первого прохождения" через стенку кишечника и через печень.

Дигидрокодеин метаболизируется в печени при участии изофермента CYP2D6 с образованием дигидроморфина, который обладает выраженной анальгезирующей активностью, хотя эффект дигидрокодеина обусловлен главным образом неизмененным веществом. Кроме того, частично дигидрокодеин метаболизируется при участии CYP3A4 до нордигидрокодеина.

Дигидрокодеин выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов, включая глюкуроновые конъюгаты.  $T_{1/2}$  составляет 3.5-5 ч.

### Показания к применению:

Боли умеренной и значительной интенсивности различного происхождения (в т.ч. в послеоперационном периоде, при травме, в онкологической практике).

### Относится к болезням:

- [Травмы](#)

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к дигидрокодеину и кодеину.

### Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в дозе 30 мг, каждые 4-6 ч. При болях значительной интенсивности доза может быть увеличена до 40-80 мг 3 раза/сут.

В качестве противокашлевого средства применяют в дозе 10 мг каждые 4-6 ч.

### **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, запор.

*Со стороны ЦНС:* сонливость, головокружение.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При длительном применении возможно развитие лекарственной зависимости, сходной по своим проявлениям с зависимостью к кодеину.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Dgk\\_Kontinus](http://drugs.thead.ru/Dgk_Kontinus)