Диацин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат.

Мебгидролин - блокатор H_1-гистаминовых рецепторов, обладает противозудным и противоаллергическим действием, уменьшает отек слизистых оболочек. Незначительно проникая в ЦНС, оказывает слабое седативное действие.

Цинка сульфат - вяжущее противовоспалительное средство; при контакте со слизистыми оболочками возникает уплотнение коллоидов, внеклеточной жидкости, слизи, экссудата, поверхности клеток. Образующаяся при этом пленка предохраняет окончания чувствительных нервов от раздражения, что предупреждает развитие воспалительного процесса и устраняет побочное раздражающее действие мебгидролина на ЖКТ.

Показания к применению:

— сенная лихорадка;

— конъюнктивит;

— аллергический ринит;

— крапивница;

— экзема;

— кожный зуд;

— лекарственная сыпь;

— кожная реакция после укуса насекомого;

— зудящий дерматоз.

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия

- Дерматит
- Зуд
- Конъюнктивит
- Крапивница
- Лихорадка
- Ринит
- Сенная лихорадка
- Экзема

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— гипертрофия предстательной железы;

— закрытоугольная глаукома.

Способ применения и дозы:

Внутрь **взрослым** - по 400 мг (в пересчете на мебгидролин) 1 раз/сут или по 200 мг 2 раза/сут; **детям** - по 200 мг 1 раз/сут. Курс лечения - 10-15 дней.

Высшая суточная доза для **взрослых** - 600 мг, для **детей** - 400 мг.

Побочное действие:

Тошнота, боль в животе, тревожность (по ночам), головокружение, тремор, парестезии, сухость во рту, повышенная утомляемость, аллергические реакции, крайне редко - агранулоцитоз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие этанола, седативных лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Diacin