

## [Диацин](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат.

Мебгидролин - блокатор H<sub>1</sub>-гистаминовых рецепторов, обладает противозудным и противоаллергическим действием, уменьшает отек слизистых оболочек. Незначительно проникая в ЦНС, оказывает слабое седативное действие.

Цинка сульфат - вяжущее противовоспалительное средство; при контакте со слизистыми оболочками возникает уплотнение коллоидов, внеклеточной жидкости, слизи, экссудата, поверхности клеток. Образующаяся при этом пленка предохраняет окончания чувствительных нервов от раздражения, что предупреждает развитие воспалительного процесса и устраняет побочное раздражающее действие мебгидролина на ЖКТ.

### **Показания к применению:**

- сенная лихорадка;
- конъюнктивит;
- аллергический ринит;
- крапивница;
- экзема;
- кожный зуд;
- лекарственная сыпь;
- кожная реакция после укуса насекомого;
- зудящий дерматоз.

### **Относится к болезням:**

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)

- [Дерматит](#)
- [Зуд](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Крапивница](#)
- [Лихорадка](#)
- [Ринит](#)
- [Сенная лихорадка](#)
- [Экзема](#)

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- гипертрофия предстательной железы;
- закрытоугольная глаукома.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь **взрослым** - по 400 мг (в пересчете на мебгидролин) 1 раз/сут или по 200 мг 2 раза/сут; **детям** - по 200 мг 1 раз/сут. Курс лечения - 10-15 дней.

Высшая суточная доза для **взрослых** - 600 мг, для **детей** - 400 мг.

**Побочное действие:**

Тошнота, боль в животе, тревожность (по ночам), головокружение, тремор, парестезии, сухость во рту, повышенная утомляемость, аллергические реакции, крайне редко - агранулоцитоз.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Усиливает действие этанола, седативных лекарственных средств.

**Особые указания и меры предосторожности:*****Применение в детском возрасте***

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Diacin>