

## Диафлекс Ромфарм



### **Код АТХ:**

- [M01AX21](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Диацереин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Капсулы** твердые желатиновые, размер №1, желтого цвета со слабым коричневым оттенком; содержимое капсул - порошок желтого цвета.

	<b>1 капс.</b>
диацереин	50 мг

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат - 12.5 мг, лактозы моногидрат (капсулак 60) - до 250 мг.

*Состав капсулы:* титана диоксид - 750 мкг, краситель железа оксид желтый - 2.2125 мг, желатин - до 75 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

НПВС, производное антрахинолина, диацетилированное производное реина. Метаболизируясь до активного метаболита - реина, ингибирует активность интерлейкина-1, который играет важную роль в развитии воспаления и дегенерации хряща при остеоартрозе.

Ингибирует действие других цитокинов (в т.ч. интерлейкина-6, ФНО $\alpha$ ). Действие развивается через 2-4 недели.

Диацереин обладает анальгезирующей и противовоспалительной активностью при пероральном приеме.

### **Фармакокинетика**

#### *Всасывание*

После приема внутрь быстро всасывается из ЖКТ. При однократном приеме в дозе 50 мг  $C_{max}$  в плазме - 3.15 мг/л.  $T_{max}$  - 144 мин. Биодоступность увеличивается на 25% при одновременном приеме с пищей.

#### *Распределение*

При многократном приеме в связи с кумуляцией препарата  $C_{max}$  в плазме увеличивается.

Связывание реина с белками плазмы (альбумином) практически 100%.

Реин проникает через ГЭБ и плацентарный барьер.

#### *Метаболизм*

Диацереин полностью деацетируется до реина.

#### *Выведение*

$T_{1/2}$  - 255 мин. Выводится почками в неизменном виде (20%), в виде глюкуронида (60%), в виде сульфата - 20%.

## **Показания к применению:**

— первичный и вторичный остеоартроз.

## **Относится к болезням:**

- [Остеoarтрит](#)
- [Остеoarтроз](#)

## **Противопоказания:**

- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к антрахиноновым слабительным лекарственным средствам.

*С осторожностью:* тяжелая печеночная или почечная недостаточность, кишечная непроходимость, воспалительные заболевания кишечника.

## **Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь, по 50 мг 2 раза/сут (утром и вечером), непрерывно длительно или курсами (не менее 4 мес).

Капсулы следует принимать после еды, проглатывая целиком, не разжевывая, запивая водой.

Диафлекс Ромфарм в течение первых 2 недель может вызвать ускорение транзита в кишечнике, поэтому рекомендуется начинать лечение с 50 мг (1 капс.)/сут (вечером, с пищей) в течение 4 недель. Затем дозу увеличивают до 100 мг/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* диарея, тошнота, рвота, боль в животе, гепатит.

*Аллергические реакции:* крапивница, лихорадка, бронхоспазм, ангионевротический отек, анафилактический шок.

*Прочие:* недомогание, интенсивное окрашивание мочи (в зависимости от pH) от желтого до коричневого цвета (не имеет клинического значения).

## Передозировка:

*Симптомы:* диарея, слабость.

*Лечение:* проведение симптоматической терапии. При выраженной диарее необходим контроль электролитного состава плазмы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации. При приеме препарата необходимо отменить грудное вскармливание.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диафлекс Ромфарм не рекомендуется принимать вместе с препаратами, увеличивающими объем содержимого кишечника (например, большое количество клетчатки).

Лекарственные средства, содержащие алюминия гидроксид и/или магния гидроксид, снижают биодоступность диацереина.

Антациды уменьшают абсорбцию препарата.

При одновременном приеме с антибиотиками или химиотерапевтическими препаратами, влияющими на микрофлору кишечника, может повыситься частота нежелательных явлений со стороны кишечника.

Одновременное применение со слабительными средствами не рекомендуется.

## Особые указания и меры предосторожности:

Продолжительность лечения может быть длительной.

До наступления терапевтического эффекта, диацереин можно принимать одновременно с анальгезирующими препаратами (в т.ч. ингибиторами ЦОГ).

Необходим периодический контроль показателей крови, функциональных проб печени (определение уровня печеночных трансаминаз), мочи (определение уровня креатинина и КК).

При ухудшении функции почек необходимо снизить дозу препарата. У пациентов с хронической почечной недостаточностью, при КК менее 30 мл/мин доза диацереина должна быть снижена до 50 мг/сут и затем оттитрована согласно переносимости и клинической эффективности.

Окрашивание мочи может затруднять интерпретацию результатов анализа мочи (например, на содержание глюкозы).

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Нет данных.

### **При нарушениях функции почек**

При ухудшении функции почек необходимо снизить дозу препарата. У пациентов с хронической почечной недостаточностью, при КК менее 30 мл/мин доза диацереина должна быть снижена до 50 мг/сут и затем оттитрована согласно переносимости и клинической эффективности.

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Diafleks\\_Romfarm](http://drugs.thead.ru/Diafleks_Romfarm)