Диамидазепам



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Анксиолитик (транквилизатор) бензодиазепинового ряда. Оказывает также противосудорожное, ноотропное и центральное миорелаксирующее действие.

Усиливает тормозное влияние GABA в ЦНС за счет повышения чувствительности GABA-рецепторов к медиатору. Стимулирует бензодиазепиновые рецепторы, уменьшает возбудимость подкорковых структур головного мозга, тормозит полисинаптические спинальные рефлексы.

Анксиолитическое действие проявляется в уменьшении эмоционального напряжения, ослаблении тревоги, страха, беспокойства; седативный эффект - в отношении симптоматики невротического происхождения: тревоги, страха. На продуктивную симптоматику психотического генеза (острые бредовые, галлюцинаторные, аффективные расстройства) практически не влияет, редко наблюдается уменьшение аффективной напряженности, бредовых расстройств. В отличие от остальных бензодиазепинов обладает активирующим эффектом

Показания к применению:

— невротические и неврозоподобные состояния (тревожность, страх, раздражительность, эмоциональная лабильность, бессонница, психопатия);

— вегетативная лабильность (в т.ч. диэнцефальная патология);

— мигрень;

— логоневроз;

— абстинентный алкогольный синдром, алкоголизм (комплексное лечение).

Относится к болезням:

- Алкоголизм
- Бессонница
- Мигрень
- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— миастения;

— печеночная недостаточность;

— хроническая почечная недосточность;

— беременность;

— период лактации.

С *осторожностью:* открытоугольная глаукома.

Способ применения и дозы:

Принммают внутрь, по 20-50 мг 3 раза/сут. При необходимости дозу постепенно повышают до получения терапевтического эффекта.

Средняя доза при лечении больных с *невротическими и неврозоподобными расстройствами* - 60-150 мг/сут, при *мигренях и логоневрозах* - 40-60 мг/сут.

Для *купирования алкогольной абстиненции* начальная доза - 50 мг, средняя суточная доза - 150 мг; максимальная суточная доза - 500 мг.

Продолжительность лечения - от нескольких дней до 1-2 мес, длительность - определяется состоянием больного и переносимостью препарата.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: сонливость, вялость, миастения, замедление скорости психических и двигательных реакций, привыкание, лекарственная зависимость, шаткость походки, снижение способности к концентрации внимания, нарушение кратковременной памяти.

Прочее: диспепсия, снижение потенции и/или либидо, дисменорея, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание: беременность и период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает влияние на ЦНС этанола, снотворных, антипсихотических средств (нейролептиков), опиоидных анальгетиков.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказание: хроническая почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказание: печеночная недостаточность.

Источник: http://drugs.thead.ru/Diamidazepam