

## [Диазолин \(таблетки\)](#)



### **Код АТХ:**

- [R06AX15](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Меггидролин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Интермедианты](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов, производное этилендиамина. Оказывает противоаллергическое, противозудное, противоэкссудативное, а также слабое седативное действие. Обладает м-холиноблокирующими свойствами.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность составляет 40-60%. Практически не проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени путем метилирования. Вызывает индукцию микросомальных ферментов печени. Выводится почками.

### **Показания к применению:**

Сенная лихорадка, крапивница, экзема, кожный зуд, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, кожная реакция после укуса насекомого; бронхиальная астма (в составе комбинированной терапии).

### **Относится к болезням:**

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Астма](#)

- [Бронхиальная астма](#)
- [Бронхит](#)
- [Зуд](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Крапивница](#)
- [Лихорадка](#)
- [Ринит](#)
- [Экзема](#)

### Противопоказания:

Гипертрофия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания ЖКТ в фазе обострения; повышенная чувствительность к мебгидролину, пилоростеноз, эпилепсия, нарушения сердечного ритма (обладая ваголитическим действием, может улучшать AV-проводимость и способствовать развитию наджелудочковых аритмий), беременность, период лактации.

### Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 10 лет - 100-300 мг/сут. Суточная доза для детей в возрасте 5-10 лет - 100-200 мг; 2-5 лет - 50-150 мг; до 2 лет - 50-100 мг.

### Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - сухость во рту, диспептические явления вследствие раздражения слизистой желудка.

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* возможны головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, тремор, сонливость.

*Со стороны системы кроветворения:* в единичных случаях - гранулоцитопения, агранулоцитоз.

*Со стороны мочевыделительной системы:* в единичных случаях - дизурия.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Мебгидролин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Мебгидролин усиливает действие седативных средств и этанола.

### Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют при печеночной и/или почечной недостаточности (может потребоваться коррекция дозы и интервалов между приемами).

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (вождение транспортных средств или работа с механизмами).

#### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью применяют при почечной недостаточности (может потребоваться коррекция дозы и интервалов между приемами).

#### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью применяют при печеночной недостаточности (может потребоваться коррекция дозы и интервалов между приемами).

## **Диазолин (таблетки)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### ***Применение в детском возрасте***

Детям старше 10 лет - 100-300 мг/сут. Суточная доза для детей в возрасте 5-10 лет - 100-200 мг; 2-5 лет - 50-150 мг; до 2 лет - 50-100 мг.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Diazolin\\_tabletki](http://drugs.thead.ru/Diazolin_tabletki)