Дибикор

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Таурин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.

	1 таб.
таурин	250 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 23 мг, крахмал картофельный - 18 мг, желатин - 6 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 0.3 мг, кальция стеарат - 2.7 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

◊ ***Таблетки*** белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с риской и фаской.

	1 таб.
таурин	500 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 46 мг, крахмал картофельный - 36 мг, желатин - 12 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 0.6 мг, кальция стеарат - 5.4 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Таурин является естественным продуктом обмена серосодержащих аминокислот: цистеина, цистеамина, метионина. Таурин обладает осморегуляторным и мембранопротекторным свойствами, положительно влияет на фосфолипидный состав мембран клеток, нормализует обмен ионов кальция и калия в клетках. У таурина выявлены свойства тормозного нейромедиатора, он обладает антистрессорным действием, может регулировать высвобождение ГАМК, адреналина, пролактина и других гормонов, а также регулировать ответы на них. Участвуя в синтезе белков дыхательной цепи в митохондриях, таурин регулирует окислительные процессы и проявляет антиоксидантные свойства; влияет на ферменты, такие как цитохромы, ответственные за метаболизм различных ксенобиотиков.

Дибикор улучшает метаболические процессы в сердце, печени и других органах и тканях. При хронических диффузных заболеваниях печени Дибикор увеличивает кровоток и уменьшает выраженность цитолиза. Лечение препаратом Дибикор при сердечно-сосудистой недостаточности ведет к уменьшению застойных явлений в малом и большом кругах кровообращения: снижается внутрисердечное диастолическое давление, повышается сократимость миокарда (максимальная скорость сокращения и расслабления, индексы сократимости и релаксации). Препарат умеренно снижает АД у пациентов с артериальной гипертензией и практически не влияет на его уровень у больных с сердечно-сосудистой недостаточностью с пониженным АД. Дибикор уменьшает побочные явления, возникающие при передозировке сердечных гликозидов и блокаторов медленных кальциевых каналов, снижает гепатотоксичность противогрибковых препаратов. Повышает работоспособность при тяжелых физических нагрузках.

При сахарном диабете приблизительно через 2 недели после начала приема препарата Дибикор снижается уровень глюкозы в крови. Замечено также значительное уменьшение концентрации триглицеридов, в меньшей степени - уровня холестерина, уменьшение атерогенности липидов плазмы. При длительном применении препарата (около 6 месяцев) отмечено улучшение микроциркуляторного кровотока глаза.

Фармакокинетика

После однократного приема 500 мг таурин через 15-20 мин определяется в крови, достигая C_{max} через 1.5-2 ч. Полностью препарат выводится через сутки.

Показания к применению:

— сердечно-сосудистая недостаточность разной этиологии;

— интоксикация, вызванная сердечными гликозидами;

— сахарный диабет 1 типа;

— сахарный диабет 2 типа, в т.ч. с умеренной гиперхолестеринемией;

— в качестве гепатопротектора у пациентов, принимающих противогрибковые препараты.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Гиперхолестеринемия
- Интоксикация
- Сахарный диабет
- Холера

Противопоказания:

— возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

При *сердечной недостаточности* Дибикор принимают внутрь по 250-500 мг 2 раза/сут за 20 мин до еды, курс лечения - 30 дней. Доза может быть увеличена до 2-3 г/сут или уменьшена до 125 мг на прием.

При *интоксикции сердечными гликозидами* - не менее 750 мг/сут.

При *сахарном диабете 1 типа* - по 500 мг 2 раза/сут в сочетании с инсулинотерапией в течение 3-6 месяцев.

При *сахарном диабете 2 типа* - по 500 мг 2 раза/сут в монотерапии или в сочетании с другими пероральными гипогликемическими средствами.

При *сахарном диабете 2 типа, в т.ч. с умеренной гиперхолестеринемией,* - по 500 мг 2 раза/сут. Длительность курса - по рекомендации врача.

В *качестве гепатопротектора* - по 500 мг 2 раза/сут в течение всего курса приема противогрибковых препаратов.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка:

Данные о передозировке отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о применении препарата при беременности и в период лактации не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Дибикор может применяться с другими лекарственными средствами; усиливает инотропный эффект сердечных гликозидов.

Особые указания и меры предосторожности:

На фоне приема препарата Дибикор следует уменьшать дозу сердечных гликозидов иногда в 2 раза, в зависимости от чувствительности пациентов к сердечным гликозидам. Это же правило относится к блокаторам медленных кальциевых каналов.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в возрасте до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dibikor