# Дицинон



## Код АТХ:

- B02BX01

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Этамзилат

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Таблетки*** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| этамзилат | 250 мг |

*Вспомогательные вещества:* лимонная кислота безводная, крахмал кукурузный, повидон K25, магния стеарат, лактоза.

10 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.

***Раствор для в/в и в/м введения*** бесцветный, прозрачный.

| | **1 мл** | **1 амп.** |
|---|---|---|
| этамзилат | 125 мг | 250 мг |

*Вспомогательные вещества:* натрия дисульфит, вода д/и, натрия гидрокарбонат (используется в некоторых случаях для коррекции pH).

2 мл - ампулы бесцветного стекла (10) - блистеры (5) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства
- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Гемостатический препарат. Препарат увеличивает образование в стенках капилляров мукополисахаридов большой молекулярной массы и повышает устойчивость капилляров, нормализует их проницаемость при патологических процессах, улучшает микроциркуляцию. Оказывает гемостатическое действие, которое обусловлено активацией формирования тромбопластина в месте повреждения мелких сосудов. Препарат стимулирует образование фактора

свертывания крови III, нормализует адгезию тромбоцитов. Препарат не влияет на протромбиновое время, не обладает гиперкоагуляционными свойствами и не способствует образованию тромбов.

После в/в введения препарат начинает действовать через 5-15 мин; максимальный эффект наблюдается через 1 ч, продолжительность действия составляет 4-6 ч.

***Фармакокинетика***

*Всасывание и распределение*

После в/в введения препарата в дозе 500 мг $C_{max}$ достигается через 10 мин и составляет 50 мкг/мл.

После приема внутрь препарат быстро и почти полностью всасывается. После приема препарата в дозе 50 мг $C_{max}$ достигается через 4 ч и составляет 15 мкг/мл.

Этамзилат проникает через плацентарный барьер и выводится с грудным молоком.

*Выведение*

Около 72% от введенной дозы выводится почками в течение первых 24 ч в неизмененном виде.

После в/в введения $T_{1/2}$ составляет около 2 ч, после приема внутрь $T_{1/2}$ составляет около 8 ч.

## Показания к применению:

Профилактика и лечение капиллярных кровотечений различной этиологии:

— во время и после хирургических операций на всех хорошо васкуляризированных тканях в оториноларингологии, гинекологии, акушерстве, урологии, стоматологии, офтальмологии и пластической хирургии;

— гематурия, метроррагия, первичная меноррагия, меноррагия у женщин с внутриматочными контрацептивами, носовое кровотечение, кровоточивость десен;

— диабетическая микроангиопатия (геморрагическая диабетическая ретинопатия, повторные кровоизлияния в сетчатку, гемофтальм);

— внутричерепные кровоизлияния у новорожденных и недоношенных детей.

## Относится к болезням:

- Васкулит
- Геморрой
- Диабетическая ретинопатия
- Метроррагия
- Ретинопатия
- Стоматит

## Противопоказания:

— острая порфирия;

— гемобластоз у детей (лимфобластный и миелобластный лейкоз, остеосаркома);

— тромбоз;

— тромбоэмболия;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата и натрия сульфиту;

— повышенная чувствительность к натрия сульфиту (раствор для в/в и в/м введения).

С *осторожностью* следует назначать препарат при тромбозе, тромбоэмболии в анамнезе, кровотечениях на фоне передозировки антикоагулянтов.

## Способ применения и дозы:

**Таблетки**

Оптимальная суточная доза для **взрослых** составляет 10-20 мг/кг массы тела, разделенная на 3-4 приема. В большинстве случаев разовая доза составляет 250-500 мг 3-4 раза/сут. В исключительных случаях разовая доза может быть повышена до 750 мг 3-4 раза/сут.

При *меноррагии* назначают 750-1000 мг/сут, начиная с 5 дня ожидаемой менструации до 5 дня следующего менструального цикла.

В *послеоперационном периоде* препарат назначают в разовой дозе 250-500 мг каждые 6 ч до исчезновения риска развития кровотечения.

**Детям** назначают в суточной дозе 10-15 мг/кг в 3-4 приема.

**Раствор для в/м и в/в инъекций**

Оптимальная суточная доза для **взрослых** составляет 10-20 мг/кг, разделенная на 3-4 в/м или в/в (медленных) инъекции.

**Взрослым** при *оперативных вмешательствах* профилактически вводят в/в или в/м 250-500 мг за 1 ч до операции. Во время операции в/в вводят 250-500 мг, введение данной дозы можно повторить еще раз. После операции вводят 250-500 мг каждые 6 ч до исчезновения риска развития кровотечения.

Для **детей** суточная доза составляет 10-15 мг/кг массы тела, разделенная на 3-4 введения.

В *неонатологии:* Дицинон вводят в/м или в/в (медленно) в дозе 12.5 мг/кг (0.1 мл=12.5 мг). Лечение следует начать в течение первых 2 ч после рождения.

Если Дицинон смешивают с физиологическим раствором, то его следует вводить немедленно.

## Побочное действие:

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* головная боль, головокружение, парестезии нижних конечностей.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, изжога, тяжесть в эпигастральной области.

*Прочие:* аллергические реакции, гиперемия кожи лица, снижение систолического АД.

## Передозировка:

Данные по передозировке препарата Дицинон не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности возможно только в случаях, когда потенциальная польза терапии для матери превышает возможный риск для плода.

При необходимости назначения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Введение в дозе 10 мг/кг массы тела за 1 ч до введения декстранов предотвращает их антиагрегантное действие. Введение Дицинона после введения декстранов не оказывает гемостатического действия.

Возможно сочетание с аминокапроновой кислотой и менадиона натрия бисульфитом.

*Фармацевтическое взаимодействие*

Фармацевтически несовместим (в одном шприце) с другими лекарственными средствами.

Несовместим с раствором натрия бикарбоната для инъекций и раствором натрия лактата.

## Особые указания и меры предосторожности:

Перед началом лечения следует исключить другие причины кровотечения.

1 таблетка Дицинона содержит 60.5 мг лактозы (максимальная суточная доза лактозы не должна превышать 5 г). Не следует назначать препарат больным с врожденной непереносимостью глюкозы, дефицитом лактазы lapp (лактазная недостаточность у некоторых народностей Севера) или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.

При появлении окрашивания раствора для в/м и в/в введения, его применять нельзя.

Раствор для в/м и в/в введения предназначен только для применения в стационарах и поликлиниках.

Раствор для в/м и в/в инъекций можно применять местно: стерильный тампон или марлевую салфетку пропитывают раствором и накладывают на рану (например, кожный трансплантат, удаление зуба).

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не требуется специальных предосторожностей.

***Применение в детском возрасте***

Возможно применение по показанием и в дозах, скорректированных в соответствии с возрастом пациента.

## Условия хранения:

Таблетки следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C.

Раствор для в/м и в/в инъекций следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Dicinon