

## [Диклак](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диклофенак](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения 5%** бесцветный или слегка желтоватый, прозрачный, гомогенный и не содержащий пузырьков, с характерным запахом изопропилового спирта.

	<b>1 г</b>
диклофенак натрия	50 мг

*Вспомогательные вещества:* изопропиловый спирт, макроголь-7-глицерилкокоат, гипромеллоза, масло ароматное, вода очищенная.

50 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

100 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

НПВС для наружного применения. Обладает выраженным анальгезирующим и противовоспалительным действием. Незбирательно угнетая ЦОГ-1 и ЦОГ-2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты и синтез простагландинов, являющихся основным звеном в развитии воспаления.

В области применения Диклак устраняет болевой синдром и уменьшает отечность, связанную с воспалительным процессом.

#### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетики препарата Диклак не предоставлены.

## Показания к применению:

- заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз периферических суставов и позвоночника;
- ревматические поражения мягких тканей;
- мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;
- травматические повреждения мягких тканей.

## Относится к болезням:

- [Анкилозирующий спондилоартрит](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Псориаз](#)
- [Ревматизм](#)
- [Спондилоартрит](#)
- [Травмы](#)

## Противопоказания:

- "аспириновая" астма;
- нарушение целостности кожных покровов;
- III триместр беременности;
- период лактации (грудное вскармливание);
- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВС.

С *осторожностью* следует применять препарат при печеночной порфирии (обострение), эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ, тяжелых нарушениях функции печени и почек, при хронической сердечной недостаточности, при бронхиальной астме, у пациентов пожилого возраста, в I и II триместрах беременности.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют наружно.

**Взрослым и детям старше 6 лет** препарат наносят на кожу и слегка втирают, кратность применения - 2-3 раза/сут. Необходимое количество препарата зависит от размера области поражения. Разовая доза препарата - до 2 г (около 4 см при полностью открытой горловине тубы). После нанесения препарата руки необходимо вымыть.

Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта. После 2 недель применения препарата пациент должен проконсультироваться с врачом.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* экзема, фотосенсибилизация, контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы, шелушение).

*Системные реакции:* генерализованная кожная сыпь, аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспастические реакции), фотосенсибилизация.

## **Передозировка:**

Крайне низкая системная абсорбция активного компонента препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Препарат противопоказан в III триместре беременности. Необходимость назначения препарата в I и II триместрах беременности врач определяет индивидуально.

Опыта применения препарата Диклак в период лактации (грудного вскармливания) не имеется.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Диклак может усиливать действие препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию. Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Диклак следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. После нанесения не следует накладывать окклюзионную повязку.

Не допускать попадания препарата на глаза и слизистые оболочки.

### ***При нарушениях функции почек***

*С осторожностью* следует применять препарат при тяжелых нарушениях функции почек.

### ***При нарушениях функции печени***

*С осторожностью* следует применять препарат при печеночной порфирии (обострение), тяжелых нарушениях функции печени.

### ***Применение в пожилом возрасте***

*С осторожностью* следует применять препарат у пациентов пожилого возраста.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 6 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Diklak>