Дикловит



Код АТХ:

- M02AA15

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Диклофенак

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель*** бесцветный или с желтоватым или с кремоватым оттенком, полупрозрачный.

	1 г
диклофенак натрия	10 мг

Вспомогательные вещества: молочная кислота 40% - 0.11 г, изопропанол (2-пропанол) - 15 г, этанол (спирт этиловый ректификованный) - 15 мг, натрия дисульфит (натрия метабисульфит) - 0.05 г, карбомер (карбопол) - до 1.5 г, троламин (2,2',2''-нитрилотриэтанол) - до 3 г (для получения геля с pH от 7.0 до 8.5), вода (вода очищенная) - до 100 г.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС. При наружном применении оказывает местное противовоспалительное и анальгезирующее действие. Механизм действия обусловлен ингибированием активности ЦОГ I и II, что приводит к нарушению метаболизма арахидоновой кислоты и подавлению синтеза простагландинов в очаге воспаления. Водно-спиртовая основа геля оказывает дополнительное местноанестезирующее действие. При наружном применении приводит к исчезновению или ослаблению болей в месте нанесения геля, уменьшает боли в суставах в покое и при движении, а также утреннюю скованность и припухлость суставов. Способствует увеличению объема движений в пораженных суставах.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Дикловит не предоставлены.

Показания к применению:

— воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата (в т.ч. ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, псориатический артрит, ювенильный артрит, острый и хронический подагрический артрит);

— ревматические поражения мягких тканей;

— посттравматический болевой синдром (в т.ч. травматические ушибы, растяжения связок, мышц и сухожилий);

— болезненность мышц и суставов, вызванных тяжелыми физическими нагрузками;

— люмбаго;

— ишиас;

— невралгии.

Относится к болезням:

- Анкилозирующий спондилоартрит
- Артрит
- Артроз
- Болевой синдром
- Ишиас
- Люмбаго
- Невралгия
- Неврит
- Подагра
- Псориаз
- Ревматизм
- Спондилоартрит
- Травмы
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

— нарушение кроветворения неясного генеза;

— нарушение целостности кожных покровов;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— детский возраст до 6 лет;

— повышенная чувствительность к диклофенаку натрия, ацетилсалициловой кислоте и другим НПВС.

С *осторожностью* назначают при индуцируемой острой печеночной порфирии, нарушении функции почек и печени, сердечной недостаточности.

Способ применения и дозы:

Небольшое количество геля (2-4 г, что соответствует полоске геля 1-2 см) наносят 2-3 тонким слоем на участок кожи над очагом воспаления и слегка втирают до полного всасывания.

Продолжительность применения препарата составляет до 14 дней, в отдельных случаях возможен более длительный курс терапии.

Побочное действие:

Аллергические реакции: местные кожные проявления (в т.ч. зуд, сыпь, жжение, гиперемия); при длительном применении и/или при нанесении на обширные поверхности возможны системные реакции, обусловленные резорбтивным действием (в т.ч. генерализованная кожная сыпь, бронхоспазм, ангионевротический отек, фотосенсибилизация).

Возникновение и выраженность побочных эффектов зависят от индивидуальной чувствительности, величины дозы и продолжительности применения.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Дикловит не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Дикловит противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении препарата следует учитывать возможность лекарственного взаимодействия с другими НПВС.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания геля в глаза и на слизистые оболочки.

Пациент должен быть предупрежден о необходимости вымыть руки после нанесения геля.

При появлении побочных эффектов следует прекратить применение препарата.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью* назначают при нарушении функции почек.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* назначают при индуцируемой острой печеночной порфирии, нарушении функции печени.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Diklovit