

## [Димексид \(концентрат\)](#)



### **Код АТХ:**

- [M02AX03](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Диметилсульфоксид](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противовоспалительное средство для наружного применения. Механизм действия связан с инактивацией гидроксильных радикалов и улучшением метаболических процессов в очаге воспаления, снижением скорости проведения возбуждающих импульсов в периферических нейронах. Оказывает местноанестезирующее, местное противовоспалительное, анальгетическое и противомикробное действие; обладает некоторой фибринолитической активностью. Проникает через кожу и другие биологические мембраны, повышает их проницаемость для лекарственных веществ.

### **Показания к применению:**

Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, деформирующий остеоартроз, склеродермия, узловатая эритема; ушибы, растяжения связок, травматические инфильтраты; воспалительные заболевания кожи; тромбофлебиты; акне, фурункулез (в составе комплексной терапии).

### **Относится к болезням:**

- [Акне](#)
- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Инфильтраты](#)
- [Остеоартрит](#)

## Димексид (концентрат)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- [Остеоартроз](#)
- [Растяжение](#)
- [Склерит](#)
- [Склеродермия](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Узловатая эритема](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)
- [Фурункул](#)
- [Эритема](#)

### Противопоказания:

Нарушение функции печени и/или почек, стенокардия, инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз, глаукома, катаракта, кома, беременность, лактация.

### Способ применения и дозы:

Применяют наружно.

### Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции, зудящий дерматит, контактный дерматит, эритема, сухость кожи, легкое жжение.

*Редко:* бронхоспазм.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Диметилсульфоксид противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно применение диметилсульфоксида в сочетании с гепарином, антибиотиками и НПВС в лекарственных формах для наружного применения.

Увеличивает всасывание и усиливает действие этанола, инсулина.

Повышает чувствительность микроорганизмов к аминогликозидным и бета-лактамамным антибиотикам, хлорамфениколу, рифампицину, гризеофульвину.

Сенсибилизирует организм к средствам для общей анестезии.

### Особые указания и меры предосторожности:

Диметилсульфоксид применяют с осторожностью одновременно с другими лекарственными средствами, поскольку он может усиливать их действие.

Перед применением диметилсульфоксида рекомендуется проводить пробу на лекарственную переносимость.

#### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при нарушении функции почек.

#### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при нарушении функции печени.

## **Димексид (концентрат)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Dimeksid\\_koncentrat](http://drugs.thead.ru/Dimeksid_koncentrat)