

Диосмектит



Код АТХ:

- [A07BC05](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Смектит диоктаэдрический](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Адсорбирующее и противодиарейное средство природного происхождения. Оказывает защитное действие на слизистую оболочку кишечника, обладает выраженным адсорбирующим и слабовыраженным обволакивающим действием. Является стабилизатором слизистого барьера, проникает в слизь и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия H^+ ионов, кишечных микроорганизмов и их токсинов.

Фармакокинетика

Не абсорбируется, выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

Симптоматическое лечение болей, связанных с заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки; кишечная колика; острая и хроническая диарея (особенно у детей).

Относится к болезням:

- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)

Диосмектит

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Противопоказания:

Кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к диосмектиту.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь для взрослых суточная доза составляет 9 г. Для детей в возрасте старше 2 лет - 6-9 г/сут, в возрасте 1-2 лет - 6 г/сут, в возрасте до 1 года - 3 г/сут.

Побочное действие:

В отдельных случаях: запоры, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме внутрь диосмектит уменьшает скорость и/или степень абсорбции других лекарственных препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

Интервал между приемом диосмектита и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Diosmektit>