

Дип Хит



Код АТХ:

- [M02AC](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Крем для наружного применения** белого цвета, с запахом ментола и метилсалицилата.

	1 г
метилсалицилат	128 мг
левоментол	59.1 мг
терпентинное масло	14.7 мг
эвкалиптовое масло	19.7 мг

Вспомогательные вещества: стеариновая кислота, ланолин (безводный), троламин, парафин жидкий, пропиленгликоль, натрия кармеллоза, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
35 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
67 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
100 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения.

Метилсалицилат проникает через кожу, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Очищенный скипидар (терпентинное масло) при наружном применении вызывает рефлекторное увеличение кровотока, что способствует ускорению всасывания активных компонентов.

Эвкалиптовое масло при наружном применении оказывает местнораздражающее действие.

Комбинация компонентов препарата стимулирует местное кровообращение в тканях, вызывая ощущение согревания в месте нанесения крема. Действие препарата приводит к облегчению болей в мышцах и суставах.

Показания к применению:

— симптоматическое облегчение мышечной боли (в т.ч. боль в пояснице при ишиалгии, люмбаго, фиброзите, растяжениях, ушибах);

— ревматические боли;

— растирание мышц до и после спортивных тренировок.

Относится к болезням:

- [Ишиалгия](#)
- [Люмбаго](#)
- [Растяжение](#)
- [Ревматизм](#)
- [Ушиб](#)
- [Фиброз](#)
- [Фиброма](#)

Противопоказания:

— бронхиальная астма, провоцируемая приемом ацетилсалициловой кислоты или другими НПВС;

— нарушение целостности кожных покровов;

— детский возраст до 5 лет;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Для открытия тюбика следует перевернуть крышку и надавить, чтобы проколоть запаянное отверстие.

Взрослым и детям старше 12 лет нанести полоску крема длиной 4-5 см на пораженный участок или болезненную область с последующим мягким втиранием до полного впитывания 2-3 раза/сут. После применения препарата следует тщательно вымыть руки.

Детям до 12 лет наносить полоску крема длиной не более 1-2 см, не чаще 2 раз/сут.

После 2 недель применения препарата необходима консультация врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции: зуд, покраснение, крапивница.

При длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие системных побочных эффектов.

Передозировка:

Случаев передозировки не описано. Не исключается развитие передозировки при случайном проглатывании большого количества препарата. В этом случае необходимо проводить симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Метилсалицилат усиливает эффект антикоагулянтов, метотрексата при абсорбции, что следует учитывать при использовании препарата в высоких дозах в течение длительного времени.

Особые указания и меры предосторожности:

Дип Хит следует наносить на неповрежденные кожные покровы, избегая попадания в глаза и на слизистые оболочки. Не следует использовать окклюзионные повязки.

Препарат не загрязняет одежду и постельное белье.

Если пациент использует другие лекарственные средства, перед применением препарата необходима консультация врача.

Использование в педиатрии

Препарат не следует применять у **детей до 12 лет** без консультации врача.

Применение в детском возрасте

Препарат не следует применять у **детей до 12 лет** без консультации врача.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dip_Hit