Дипана



Код АТХ:

- A05BA

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой светло-зеленого цвета, продолговатые, двояковыпуклые, с закругленными концами, со специфическим запахом.

	1 таб.
сухие водные экстракты следующих растений:	
пикрорхизы курроа (Picrorhiza Kurroa Benth.)	80 мг
андрографиса метельчатого (Andrographis paniculata Nees.)	40 мг
эклипты белой (Eclipta alba Hassk.)	40 мг
филлантуса нирури (Phyllanthus niruri L.)	40 мг
паслена черного (Solanum nigrum L.)	30 мг
тиноспоры сердцелистной (Tinospora cordifolia Miers.)	30 мг
иссопа водного (Bacopa monnieri Linn.)	10 мг
бурхавии раскидистой (Boerhaavia diffusa L.)	10 мг
имбиря лекарственного (Zingiber officinale Roscoe)	10 мг
перца длинного (Piper longum L.)	8 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, магния гидроксисиликат, магния стеарат, натрия карбоксиметилкрахмал, натрия кроскармеллоза, натрия лаурилсульфат, натрия метилпарагидроксибензоат, натрия пропилпарагидроксибензоат, натрия бензоат, бронопол.

Состав оболочки: пленочное покрытие Instacoat IC-S-2372 (гипромеллоза, макрогол, магния гидросиликат, титана диоксид, краситель хинолин желтый, краситель бриллиантовый голубой), покрытие Instacoat IC-S-344 (гипромеллоза, диэтилфталат, этилцеллюлоза).

12 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.
90 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротектор растительного происхождения. Представляет собой комплекс биологически активных веществ

растительного происхождения, предохраняющих печень от воздействия токсичных веществ (алкоголь, лекарственные препараты), стимулирует регенерацию клеток печени; нормализует белковосинтетическую функцию печени; способствует улучшению процесса пищеварения.

Дипана содержит сухие водные экстракты растений, обладающие следующим действием.

Экстракты корневищ пикрорхизы курроа, листьев и цветов андрографиса метельчатого обладают гепатопротекторным действием, предотвращая поражение печени токсическими веществами и лекарственными средствами.

Экстракт листьев и плодов паслена черного активизирует детоксикационную функцию печени, оказывая стимулирующее влияние на ферментные системы митохондрий гепатоцитов.

Экстракт листьев иссопа водного, корней и листьев эклипты белой обладают антиоксидантными свойствами, улучшают общее самочувствие пациентов.

Экстракт корней бурхавии раскидистой улучшает отток желчи.

Экстракты корней и листьев филлантуса нирури и стеблей тиноспоры сердцелистной обладают иммуномодулирующей активностью.

Экстракт корневищ имбиря лекарственного уменьшает диспепсию, нормализует перистальтику кишечника и желчевыводящих протоков.

Экстракт плодов перца длинного предотвращает развитие фиброза печени, потенцирует терапевтическое действие компонентов, входящих в состав остальных экстрактов.

Фармакокинетика

Действие препарата Дипана является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

— острые и хронические инфекционные, токсические и лекарственные гепатиты;

— алкогольная болезнь печени;

— жировая дистрофия печени различной этиологии;

— цирроз печени;

— профилактика поражения печени при хронических интоксикациях (в т.ч. при длительном употреблении алкоголя).

Относится к болезням:

- Алкогольная болезнь печени
- Гепатит
- Гепатоз
- Интоксикация
- Инфекции
- Цирроз печени

Противопоказания:

— период лактации (грудного вскармливания);

— беременность;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки следует принимать внутрь, до приема пищи, запивая достаточным количеством воды.

В качестве монотерапии при *алкогольной болезни или жировой дегенерации печени* средняя рекомендуемая доза составляет 2-3 таб. (в зависимости от тяжести патологии) 2 раза/сут в течение 8-12 недель.

В *составе комплексной терапии гепатитов, при токсических и лекарственных поражениях, циррозе печени* препарат назначают по 2 таб. 3 раза/сут в течение 4-8 недель.

Для *профилактики поражений печени при хронических интоксикациях* назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут в течение 4-8 недель.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

В отдельных случаях: сухость во рту, тошнота, спазмы кишечника, диарея, нарушение сна, головные боли, усиление диуреза.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Дипана не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Дипана не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Из-за отсутствия опыта применения не рекомендуется назначение препарата **детям младше 10 лет**.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dipana