

Дипана



Код АТХ:

- [A05BA](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой светло-зеленого цвета, продолговатые, двояковыпуклые, с закругленными концами, со специфическим запахом.

	1 таб.
сухие водные экстракты следующих растений:	
пикрорхизы курроа (<i>Picrorhiza Kurroa Benth.</i>)	80 мг
андрографиса метельчатого (<i>Andrographis paniculata Nees.</i>)	40 мг
эклипты белой (<i>Eclipta alba Hassk.</i>)	40 мг
филлантуса ниури (<i>Phyllanthus niruri L.</i>)	40 мг
паслена черного (<i>Solanum nigrum L.</i>)	30 мг
тиноспоры сердцелистной (<i>Tinospora cordifolia Miers.</i>)	30 мг
иссопа водного (<i>Vasora monnieri Linn.</i>)	10 мг
бурхавии раскидистой (<i>Boerhaavia diffusa L.</i>)	10 мг
имбиря лекарственного (<i>Zingiber officinale Roscoe</i>)	10 мг
перца длинного (<i>Piper longum L.</i>)	8 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, магния гидроксисиликат, магния стеарат, натрия карбоксиметилкрахмал, натрия кроскармеллоза, натрия лаурилсульфат, натрия метилпарагидроксibenзоат, натрия пропилпарагидроксibenзоат, натрия бензоат, бронопол.

Состав оболочки: пленочное покрытие Instacoat IC-S-2372 (гипромеллоза, макрогол, магния гидросиликат, титана диоксид, краситель хинолин желтый, краситель бриллиантовый голубой), покрытие Instacoat IC-S-344 (гипромеллоза, диэтилфталат, этилцеллюлоза).

12 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

90 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротектор растительного происхождения. Представляет собой комплекс биологически активных веществ

Дипана

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

растительного происхождения, предохраняющих печень от воздействия токсичных веществ (алкоголь, лекарственные препараты), стимулирует регенерацию клеток печени; нормализует белковосинтетическую функцию печени; способствует улучшению процесса пищеварения.

Дипана содержит сухие водные экстракты растений, обладающие следующим действием.

Экстракты корневищ пикрорхизы курроа, листьев и цветов андрографиса метельчатого обладают гепатопротекторным действием, предотвращая поражение печени токсическими веществами и лекарственными средствами.

Экстракт листьев и плодов паслена черного активизирует детоксикационную функцию печени, оказывая стимулирующее влияние на ферментные системы митохондрий гепатоцитов.

Экстракт листьев иссопа водного, корней и листьев эклипты белой обладают антиоксидантными свойствами, улучшают общее самочувствие пациентов.

Экстракт корней бурхавии раскидистой улучшает отток желчи.

Экстракты корней и листьев филлянтуса нирури и стеблей тиноспоры сердцелистной обладают иммуномодулирующей активностью.

Экстракт корневищ имбиря лекарственного уменьшает диспепсию, нормализует перистальтику кишечника и желчевыводящих протоков.

Экстракт плодов перца длинного предотвращает развитие фиброза печени, потенцирует терапевтическое действие компонентов, входящих в состав остальных экстрактов.

Фармакокинетика

Действие препарата Дипана является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

- острые и хронические инфекционные, токсические и лекарственные гепатиты;
- алкогольная болезнь печени;
- жировая дистрофия печени различной этиологии;
- цирроз печени;
- профилактика поражения печени при хронических интоксикациях (в т.ч. при длительном употреблении алкоголя).

Относится к болезням:

- [Алкогольная болезнь печени](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)
- [Цирроз печени](#)

Противопоказания:

- период лактации (грудного вскармливания);
- беременность;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки следует принимать внутрь, до приема пищи, запивая достаточным количеством воды.

Дипана

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

В качестве монотерапии при *алкогольной болезни или жировой дегенерации печени* средняя рекомендуемая доза составляет 2-3 таб. (в зависимости от тяжести патологии) 2 раза/сут в течение 8-12 недель.

В *составе комплексной терапии гепатитов, при токсических и лекарственных поражениях, циррозе печени* препарат назначают по 2 таб. 3 раза/сут в течение 4-8 недель.

Для *профилактики поражений печени при хронических интоксикациях* назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут в течение 4-8 недель.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

В отдельных случаях: сухость во рту, тошнота, спазмы кишечника, диарея, нарушение сна, головные боли, усиление диуреза.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Дипана не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Дипана не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Из-за отсутствия опыта применения не рекомендуется назначение препарата **детям младше 10 лет.**

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Dipana>