

## Дисфлатил



### Код АТХ:

- [A03AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Симетикон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

♦ **Капли для приема внутрь** в виде однородной молочно-белой эмульсии с запахом ананаса.

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                | <b>1 мл (27±3 капли)</b> |
| симетикон (активированный полидиметилсилоксан) | 40 мг                    |

Консерванты: бензойная кислота (Е 210), натрия бензоат (Е 211).

Вспомогательные вещества: полиоксиэтилена (2) стеарат, полиоксиэтилена (20) стеарат, натрия сахарин, ароматическая добавка (ананас), вода очищенная.

30 мл - флаконы темного стекла (1) с дозатором - коробки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Активный компонент препарата Дисфлатил - симетикон - представляет собой кремнийсодержащее соединение, обладающее поверхностной активностью и пеногасящими свойствами.

Благодаря своим физико-химическим свойствам симетикон является химически и физиологически инертным веществом, нетоксичным и не абсорбируемым мембраной клеток слизистой оболочки ЖКТ. Симетикон разрушает пузырьки газа физическим путем, изменяя их поверхностное натяжение и, тем самым, заставляя их спадаться. Благодаря данному свойству симетикон используется при симптоматическом лечении избыточного газообразования в области ЖКТ. Высвобождаемый газ затем выводится естественным способом.

## Показания к применению:

— симптоматическое лечение всех типов избыточного газообразования и скопления газов в ЖКТ: вздутие живота, метеоризм (в т.ч. послеоперационный метеоризм), аэрофагия. Применение Дисфлатила уменьшает чувство переполнения и ощущение напряжения в животе;

— подготовка к эндоскопическим, рентгенологическим, ультразвуковым, сонографическим исследованиям желудка и/или кишечника для вывода газов и воздуха из ЖКТ.

## Относится к болезням:

- [Вздутие живота](#)
- [Метеоризм](#)

## Противопоказания:

— кишечная непроходимость, сопровождающаяся сильными коликами и рвотой (в этих случаях следует немедленно обратиться к врачу);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

*Симптоматическое лечение*

**Взрослые:** по 25-50 капель, по возможности, сопровождая прием капель небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном.

**Дети в возрасте от 6 до 15 лет:** по 25-50 капель, по возможности, сопровождая прием капель небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном.

**Новорожденные и дети до 6 лет:** по 10-15 капель 2-3 раза в день во время еды (в бутылочке для грудных младенцев) или после еды.

*Профилактический прием при подготовке к исследованию желудка и/или кишечника.*

По 50 капель 3-4 раза в день в течение 2 дней, предшествующих исследованию, 50 капель утром, натощак, в день исследования и 50 капель непосредственно перед исследованием.

Перед употреблением флакон с каплями необходимо хорошо встряхнуть.

## Побочное действие:

Поскольку симетикон не абсорбируется из ЖКТ и выводится из организма в неизменном виде, препарат считается безопасным и не оказывает побочных эффектов.

В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

## Передозировка:

До настоящего времени неизвестны случаи применения чрезмерной дозы препарата.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременным женщинам и кормящим матерям из соображений осторожности следует, по возможности, вообще отказаться от приема лекарственных препаратов или обратиться к лечащему врачу.

Специальные исследования ни на людях, ни на животных не проводились. Поскольку симетикон не абсорбируется из ЖКТ и выводится в неизменном виде, применение Дисфлатила во время беременности не оказывает влияние на развитие плода. В период кормления грудью препарат не проникает в материнское молоко.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не требуется особых мер предосторожности при применении Дисфлатила каплей одновременно с другими лекарственными средствами и продуктами питания, включая чай, кофе, алкогольные напитки.

В случае наличия других заболеваний, склонности к аллергическим реакциям или при приеме других лекарственных препаратов, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При продолжительных и повторяющихся нарушениях пищеварения, необходимо установить причину данных явлений. Здесь речь может идти о неправильном питании или о недостатке двигательной активности. Если также имеют место органические нарушения или нарушения со стороны нервной системы, во всех перечисленных случаях необходимо проконсультироваться с врачом.

*Прием Дисфлатила больными диабетом.*

Дисфлатил капли не содержит сахара. Препарат содержит синтетический подсластитель - натрия сахаринат. Поэтому препарат может применяться больными диабетом.

*Прием Дисфлатила при работе с механизмами и вождении автотранспорта.*

Препарат не оказывает системного воздействия на организм и может применяться при вождении автотранспорта и при работе с механизмами.

## **Условия хранения:**

Хранить при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не следует использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Disflatil>