Дискус Композитум



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения гомеопатический бесцветный, прозрачный, без запаха.

	1 амп.
Discus intervertebralis suis (дискус интервертебралис суис) D8	22 мкл
Acidum ascorbicum (ацидум аскорбикум) D6	22 мкл
Thiaminum hydrochloricum (тиаминум гидрохлорикум) D6	22 мкл
Natrium riboflavinum phosphoricum (натриум рибофлавинум фосфорикум) D6	22 мкл
Pyridoxinum hydrochloricum (пиридоксинум гидрохлорикум) D6	22 мкл
Nicotinamidum (никотинамидум) D6	22 мкл
Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10	22 мкл
Cartilago suis (картиляго суис) D8	22 мкл
Medulla ossis suis (медулла оссис суис) D10	22 мкл
Embryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D10	22 мкл
Suprarenalis glandula suis (супрареналис гландула суис) D10	22 мкл
Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D6	22 мкл
Hydrargyrum oxydatum rubrum (гидраргирум оксидатум рубрум) D10	22 мкл
Sulfur (сульфур) D28	22 мкл
Cimicifuga racemosa (цимицифуга рацемоза) D4	22 мкл
Ledum palustre (ледум палюстре) D4	22 мкл
Pseudognaphalium obtusifolium (псеудогнафалиум обтусифолиум) D3	22 мкл
Citrullus colocynthis (цитруллюс колоцинтис) D4	22 мкл
Secale cornutum (секале корнутум) D6	22 мкл
Argentum metallicum (аргентум металликум) D10	22 мкл
Zincum metallicum (цинкум металликум) D10	22 мкл

Cuprum aceticum (купрум ацетикум) D6	22 мкл
Aesculus hippocastanum (эскулюс гиппокаштанум) D6	22 мкл
Medorrhinum (медоринум) D18	22 мкл
Ranunculus bulbosus (ранункулюс бульбосус) D4	22 мкл
Ammonium chloratum (аммониум хлоратум) D8	22 мкл
Cinchona pubescens (цинхона пубесценс) D4	22 мкл
Kalium carbonicum (калиум карбоникум) D6	22 мкл
Sepia officinalis (сепия оффициналис) D10	22 мкл
Acidum picrinicum (ацидум пикриникум) D6	22 мкл
Berberis vulgaris (берберис вульгарис) D4	22 мкл
Acidum silicicum (ацидум силицикум) D6	22 мкл
Calcium phosphoricum (кальциум фосфорикум) D10	22 мкл
Acidum DL-alpha-liponicum (ацидум ДЛ-альфа-липоникум) D8	22 мкл
Natrium diethyloxalaceticum (натриум диэтилоксалацетикум) D6	22 мкл
Nadidum (надидум) D6	22 мкл
Coenzym A (коэнзим А) D10	22 мкл

Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) - пачки картонные.
2.2 мл (2.2 г) - ампулы бесцветного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные пластиковые (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника).

Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз
- Остеохондроз

Противопоказания:

— детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают **взрослым** в/м по 1 ампуле 1-3 раза в неделю.

Курс лечения - 2-8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка:

Данные о передозировке не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение состояния). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных);

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Diskus_Kompozitum