Дисоль

Код АТХ:

- B05BB01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Натрия ацетат
- Натрия хлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный солевой раствор для регидратации и дезинтоксикации. Восстанавливает водно-электролитный баланс и КОС в организме при обезвоживании. Препятствует развитию метаболического ацидоза, увеличивает диурез. Оказывает плазмозамещающее, дезинтоксикационное, регидратирующее действие.

Показания к применению:

— регидратация;

— гиперкалиемия;

— интоксикации на фоне обезвоживания (холера, острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция).

Относится к болезням:

- Дизентерия
- Интоксикация
- Токсикоз
- Холера

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— почечная недостаточность;

— хроническая сердечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

В/в (струйно и капельно), под контролем лабораторных показателей. Соотношение введенной жидкости и диуреза определяют каждые 6 ч. В течение 1 ч вводят раствор в количестве, соответствующем 7-10% массы тела больного; затем струйное введение заменяют капельным, в течение 24-48 ч, со скоростью 40-120 кап/мин. Перед введением раствор подогревают до 36-38 град.С. Раствор вводят в количествах, необходимых для восстановления объема жидкости, потерянной с испражнениями, рвотными массами, мочой и потом.

При тяжелых формах заболеваний (гиповолемический инфекционно-токсический шок, декомпенсированный метаболический ацидоз, анурия) начинают со струйного введения препарата с последующим переходом к капельному.

При более легких формах заболеваний (интоксикация и обезвожение организма, метаболический ацидоз, олигурия) можно ограничиваться капельным введением препарата.

После устранения гиперкалиемии дальнейшая водно-солевая терапия проводится растворами "Трисоль", "Ацесоль" или "Хлосоль".

Побочное действие:

Отеки, тахикардия. В некоторых случаях возможно возникновение озноба.

Особые указания и меры предосторожности:

Терапию проводят под контролем гематокрита и концентрации электролитов крови.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

Источник: http://drugs.thead.ru/Disol