

Дисоль



Код АТХ:

- [B05BB01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натрия ацетат](#)
- [Натрия хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный солевой раствор для регидратации и дезинтоксикации. Восстанавливает водно-электролитный баланс и КОС в организме при обезвоживании. Препятствует развитию метаболического ацидоза, увеличивает диурез. Оказывает плазмозамещающее, дезинтоксикационное, регидратирующее действие.

Показания к применению:

- регидратация;
- гиперкалиемия;
- интоксикации на фоне обезвоживания (холера, острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция).

Относится к болезням:

- [Дизентерия](#)
- [Интоксикация](#)
- [Токсикоз](#)
- [Холера](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- почечная недостаточность;
- хроническая сердечная недостаточность.

Способ применения и дозы:

В/в (струйно и капельно), под контролем лабораторных показателей. Соотношение введенной жидкости и диуреза определяют каждые 6 ч. В течение 1 ч вводят раствор в количестве, соответствующем 7-10% массы тела больного; затем струйное введение заменяют капельным, в течение 24-48 ч, со скоростью 40-120 кап/мин. Перед введением раствор подогревают до 36-38 град.С. Раствор вводят в количествах, необходимых для восстановления объема жидкости, потерянной с испражнениями, рвотными массами, мочой и потом.

При тяжелых формах заболеваний (гиповолемический инфекционно-токсический шок, декомпенсированный метаболический ацидоз, анурия) начинают со струйного введения препарата с последующим переходом к капельному.

При более легких формах заболеваний (интоксикация и обезвожение организма, метаболический ацидоз, олигурия) можно ограничиваться капельным введением препарата.

После устранения гиперкалиемии дальнейшая водно-солевая терапия проводится растворами "Трисоль", "Ацесоль" или "Хлосоль".

Побочное действие:

Отеки, тахикардия. В некоторых случаях возможно возникновение озноба.

Особые указания и меры предосторожности:

Терапию проводят под контролем гематокрита и концентрации электролитов крови.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Disol>