

[Доксеф](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гравировкой "200" на одной стороне; на поперечном разрезе ядро от белого до почти белого цвета.

	1 таб.
Цефподоксим	200 мг

Вспомогательные вещества: кармеллоза кальция - 144.11 мг, лактозы моногидрат - 18 мг, гипромеллоза - 13.5 мг, натрия лаурилсульфат - 9 мг, магния стеарат - 4.5 мг.

Пленочная оболочка: опадрай белый 03-A-28718 - 11.25 мг.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Полусинтетический цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия. Оказывает бактерицидное действие.

Активен в отношении аэробных, анаэробных, грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Неактивен в отношении *Streptococcus* spp. (группы D), метициллин-резистентных штаммов *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium* spp. (групп J и K), *Pseudomonas* spp. (в т.ч. *Pseudomonas aeruginosa*), *Listeria monocytogenes*, *Acinetobacter baumannii*, *Clostridium difficile*, *Bacteroides* spp.

Устойчив к действию β-лактамаз.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей у взрослых и подростков, вызванные чувствительными микроорганизмами, в т.ч. тонзиллит, фарингит, острый синусит; острый бронхит, пневмония, обострение хронической пневмонии (особенно у лиц, злоупотребляющих алкоголем, у курильщиков и у лиц старше 65 лет).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Пневмония](#)
- [Синусит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к цефалоспорином.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально. Принимают внутрь во время еды 2 раза/сут (через каждые 12 ч). Средняя суточная доза для взрослых и подростков составляет 200-400 мг. Пациентам с выраженными нарушениями функции почек (КК ниже 40 мл/мин) разовую дозу уменьшают вдвое.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: возможны диарея, тошнота, рвота, боли в животе.

Дерматологические реакции: редко - преходящие кожные высыпания и зуд.

Со стороны ЦНС: редко - головные боли.

Со стороны лабораторных показателей: редко - транзиторное умеренное повышение активности печеночных трансаминаз и ЩФ, небольшое повышение уровня мочевины и креатинина в крови; в единичных случаях - тромбоцитоз, тромбоцитопения, лейкопения и эозинофилия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не установлена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Блокаторы гистаминовых H₂-рецепторов, (в т.ч. ранитидин) и антацидные препараты (алюминия гидроксид, натрия бикарбонат) снижают биодоступность цефподоксима.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Источник: <http://drugs.thead.ru/Doksef>