

Доктор Мом Инхайлер



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Камфора](#)
- [Левоментол](#)
- [Метилсалицилат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Карандаш для ингаляций** цилиндрический, перфорированный у основания и снабженный ингаляционным отверстием в верхней части пенал с завинчивающимся колпачком; содержащий цилиндрический тампон из волокнистой ацетат вискозы, пропитанной смесью лекарственных веществ со специфическим запахом и обернутой вощеной бумагой.

	1 карандаш
левоментол	207.7 мг
камфора	207.7 мг
метилсалицилат	61.35 мл

Вспомогательные вещества: парафин жидкий.

1 шт. - пеналы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено составом входящих в него компонентов.

Камфора оказывает антисептическое, местнораздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие.

Левоментол обладает местнораздражающим, обезболивающим, отвлекающим, противозудным и антисептическим действием. Антисептическая активность проявляется неизбирательным поражением микробных клеток. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует понижению болевых ощущений. Местное действие сопровождается сужением сосудов, ощущением холода, переходящим в ощущение легкого жжения и покалывания.

Метилсалицилат обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием. Нормализует повышенную проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, уменьшает отек и инфильтрацию воспаленных тканей.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия воспалительных заболеваний дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, трахеит) для облегчения носового дыхания при лечении острых респираторных заболеваний, сопровождающихся ринитом, чувством заложенности носа.

Относится к болезням:

- [Ларингит](#)
- [Острые респираторные заболевания](#)
- [Ринит](#)
- [Трахеит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- бронхиальная астма,
- бронхоспазм;
- коклюш;
- детский возраст до 6 лет;
- беременность;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Местно. **Детям от 6 до 11 лет** - по 1 вдоху в каждое носовое отверстие каждые 2 ч. **Детям старше 12 лет и взрослым** - по 2 вдоха в каждое носовое отверстие каждые 2 ч.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, контактная экзема, бронхоспазм, появление ощущения жжения, чиханья или усиления заложенности носа.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами нет.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендованные дозы.

Не следует использовать один карандаш более чем у одного человека. Это может привести к распространению

инфекции.

Не применять более 3 дней. Частое и продолжительное применение препарата может привести к усилению заложенности носа.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 6 лет.

Условия хранения:

Хранить в местах, недоступных для детей при температуре не выше 25°C.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_Mom_Inhayler?page=1