Доктор Мом Рабон



Код АТХ:

- M02AX10

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения*** от бесцветного до желтого цвета, с характерным запахом метилсалицилата.

	10 мл
масло эвкалиптовое	0.5 мл
левоментол	1.5 г
камфора рацемическая	1.5 г
метилсалицилат	2.5 мл

Вспомогательные вещества: ароматизатор лаванда, парафин жидкий.

10 мл - флаконы роликовые пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает местнораздражающим, отвлекающим и противовоспалительным действием.

Показания к применению:

— для симптоматической терапии в комплексном лечении острых респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем, ринитом, чувством заложенности носа, головной болью.

Относится к болезням:

- Головная боль

- Острые респираторные заболевания
- Ринит

Противопоказания:

— повреждения кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата;

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

Взрослым и детям старше 2 лет при *рините или заложенности носа* препарат наносится несколько раз в день на кожу спинки и крыльев носа, при этом следует сделать несколько глубоких вдохов.

При *головной боли* препарат наносится на кожу височной области, кожу лба.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка:

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания препарат может применятся после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными средствами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Не следует наносить на кожу подглазничной области во избежание слезотечения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 2 лет.

Условия хранения:

Хранить в местах, недоступных для детей, при температуре не выше 25°С. Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_Mom_Rabon