

Доктор Тайсс Анги Септ



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания** вишневые, лимонные, медово-липовые, облепиховые или шалфейные.

	1 таб.
анетол	2.4 мг
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
ментол рацемический	5.4 мг
масло мяты перечной	600 мкг

12 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
12 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
24 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
24 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный противомикробный препарат для местного применения в полости рта и глотки. Обладает антисептическим действием. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Показания к применению:

— лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (боль при глотании).

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

— детский возраст (до 5 лет);
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 5 лет: рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 ч. Не принимать более 8 таблеток в течение 24 ч.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны ЖКТ (тошнота, рвота). Лечение симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Во время беременности и кормления грудью принимать после консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не рекомендуется принимать при кровоточащих ранах в полости рта и горла, но в случае приема таблетку следует рассасывать с осторожностью.

Во время беременности и кормления грудью принимать после консультации с врачом. Непосредственно после приема препарата следует воздержаться от приема пищи и жидкости.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 5 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Без рецепта.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doktor_Tayss_Angi_Sept