

## Дологель Ст



### Код АТХ:

- [A01AD11](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ <b>Гель стоматологический</b>	<b>10 г</b>
бензалкония хлорид	500 мкг
лидокаина гидрохлорид	200 мг
холина салицилат	870 мг

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
10 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.  
10 г - тубы пластиковые (1) - пачки бумажные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывающий местноанестезирующее, антисептическое и противовоспалительное действие.

Холина салицилат. Противовоспалительное средство. Оказывает жаропонижающее, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Спектр антимикробного действия включает грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, некоторые грибы и вирусы. Действие развивается через 2-3 мин и длится 2-3 ч.

Бензалкония хлорид. Антисептическое средство, оказывает также противогрибковое, антипротозойное действие, инактивирует вирус герпеса. Проявляет бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков, грамотрицательных бактерий (кишечной и синегнойной палочек, протей, клебсиеллы и др.), анаэробных бактерий, грибов и плесеней. Действует на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам и другим химиотерапевтическим препаратам; подавляет плазмокоагулазу и гиалуронидазу стафилококков. Не влияет на нормальную микрофлору. Практически не всасывается при местном применении.

Лидокаин. Местный анестетик амидного типа. Обеспечивает местную анестезию путем блокирования образования и прохождения нервного импульса. Механизм действия связан со стабилизацией проницаемости мембраны нейронов для ионов натрия. Действие лидокаина развивается в течение 1 мин. Достигнутое снижение чувствительности медленно исчезает в течение 30-60 мин. При местном применении на слизистых оболочках лидокаин всасывается

умеренно.

Оптимальное противомикробное действие и адекватное обезболивание развиваются через 5-10 мин после применения препарата Дологель СТ.

## Показания к применению:

Дологель СТ применяется как местное болеутоляющее, антисептическое и противовоспалительное средство при следующих состояниях:

- зубная боль;
- повреждения слизистой оболочки полости рта (мозоли, язвы, ранки);
- инфекционно-воспалительные, язвенно-некротические и трофические заболевания слизистой оболочки полости рта;
- заболевания пародонта;
- послеоперационный период после небольших оперативных вмешательств в полости рта.

## Относится к болезням:

- [Зубная боль](#)
- [Инфекции](#)
- [Пародонтит](#)

## Противопоказания:

- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 18 лет), в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата в эти периоды;
- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

## Способ применения и дозы:

Местно, небольшое количество геля (около 10 мм) наносят на кончик чистого указательного пальца и осторожно, легкими массирующими движениями, втирают в воспаленную область 3-4 раза/день или иначе по рекомендации стоматолога.

При лечении болезней пародонта вводят в десневые карманы или осторожно втирают в воспаленные десны 1-2 раза/сут, а также в виде аппликации или пародонтологической повязки.

## Побочное действие:

Редко - аллергические реакции, чувство жжения в месте аппликации.

## Передозировка:

Случаев передозировки при местном стоматологическом применении неизвестно.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Избегать совместного применения с препаратами йода.

Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) усиливают местноанестезирующее действие лидокаина.

Препарат несовместим с мылом, а также детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза). Препарат усиливает действие противовоспалительных, жаропонижающих и анальгезирующих лекарственных средств для местного и системного применения.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Только для стоматологического местного использования.

Отсутствие сахара в составе обеспечивает возможность применения препарата у больных сахарным диабетом.

Не использовать препарат при наличии аллергических реакций к препаратам из группы нестероидных противовоспалительных средств, местным анестетикам (лидокаин) или бензалкония хлориду.

При отсутствии эффекта от использования препарата или при ухудшении, следует немедленно обратиться к врачу.

При случайном употреблении внутрь геля необходимо обратиться за медицинской помощью.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте (до 18 лет), в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата в этот период.

## **Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте!

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Dologel\\_St](http://drugs.thead.ru/Dologel_St)