# Дологель Ст



## Код АТХ:

- A01AD11

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ◊ ***Гель стоматологический*** | **10 г** |
|---|---|
| бензалкония хлорид | 500 мкг |
| лидокаина гидрохлорид | 200 мг |
| холина салицилат | 870 мг |

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.
10 г - тубы пластиковые (1) - пачки бумажные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, оказывающий местноанестезирующее, антисептическое и противовоспалительное действие.

Холина салицилат. Противовоспалительное средство. Оказывает жаропонижающее, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Спектр антимикробного действия включает грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, некоторые грибы и вирусы. Действие развивается через 2-3 мин и длится 2-3 ч.

Бензалкония хлорид. Антисептическое средство, оказывает также противогрибковое, антипротозойное действие, инактивирует вирус герпеса. Проявляет бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков, грамотрицательных бактерий (кишечной и синегнойной палочек, протея, клебсиеллы и др.), анаэробных бактерий, грибов и плесеней. Действует на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам и другим химиотерапевтическим препаратам; подавляет плазмокоагулазу и гиалуронидазу стафилококков. Не влияет на нормальную микрофлору. Практически не всасывается при местном применении.

Лидокаин. Местный анестетик амидного типа. Обеспечивает местную анестезию путем блокирования образования и прохождения нервного импульса. Механизм действия связан со стабилизацией проницаемости мембраны нейронов для ионов натрия. Действие лидокаина развивается в течение 1 мин. Достигнутое снижение чувствительности медленно исчезает в течение 30-60 мин. При местном применении на слизистых оболочках лидокаин всасывается

умеренно.

Оптимальное противомикробное действие и адекватное обезболивание развиваются через 5-10 мин после применения препарата Дологель СТ.

## Показания к применению:

Дологель СТ применяется как местное болеутоляющее, антисептическое и противовоспалительное средство при следующих состояниях:

— зубная боль;

— повреждения слизистой оболочки полости рта (мозоли, язвы, ранки);

— инфекционно-воспалительные, язвенно-некротические и трофические заболевания слизистой оболочки полости рта;

— заболевания пародонта;

— послеоперационный период после небольших оперативных вмешательств в полости рта.

## Относится к болезням:

- Зубная боль
- Инфекции
- Пародонтит

## Противопоказания:

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст (до 18 лет), в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата в эти периоды;

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

## Способ применения и дозы:

Местно, небольшое количество геля (около 10 мм) наносят на кончик чистого указательного пальца и осторожно, легкими массирующими движениями, втирают в воспаленную область 3-4 раза/день или иначе по рекомендации стоматолога.

При лечении болезней пародонта вводят в десневые карманы или осторожно втирают в воспаленные десны 1-2 раза/сут, а также в виде аппликации или пародонтологической повязки.

## Побочное действие:

Редко - аллергические реакции, чувство жжения в месте аппликации.

## Передозировка:

Случаев передозировки при местном стоматологическом применении неизвестно.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Избегать совместного применения с препаратами йода.

Ингибиторы моноаминооксидазы (МАО) усиливают местноанестезирующее действие лидокаина.

Препарат несовместим с мылом, а также детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза). Препарат усиливает действие противовоспалительных, жаропонижающих и анальгезирующих лекарственных средств для местного и системного применения.

## Особые указания и меры предосторожности:

Только для стоматологического местного использования.

Отсутствие сахара в составе обеспечивает возможность применения препарата у больных сахарным диабетом.

Не использовать препарат при наличии аллергических реакций к препаратам из группы нестероидных противовоспалительных средств, местным анестетикам (лидокаин) или бензалкония хлориду.

При отсутствии эффекта от использования препарата или при ухудшении, следует немедленно обратиться к врачу.

При случайном употреблении внутрь геля необходимо обратиться за медицинской помощью.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте (до 18 лет), в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата в этот период.

## Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте!

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Dologel_St