

## [ДОНА \(раствор\)](#)



### Код АТХ:

- [M01AX05](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Глюкозамин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Раствор для в/м введения</b>	<b>1 мл</b>	<b>1 амп.</b>
глюкозамин (в форме сульфата)	200 мг	400 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, лидокаина гидрохлорид, вода д/и.

Растворитель: диэтаноламин 24 мг, вода д/и - до 1 мл.

2 мл - ампулы темного стекла (6) в комплекте с растворителем (амп. - 6 шт.) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Дона - обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает

## ДОНА (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, облегчает нормальное отложение кальция в костной ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

### Фармакокинетика

При внутримышечном введении биодоступность 95 %, быстро распространяется в тканях,  $T_{1/2}$  около 60 часов, выводится, в основном, почками.

### Показания к применению:

- первичный и вторичный остеоартрит;
- остеохондроз;
- спондилоартроз.

### Относится к болезням:

- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Остеохондроз](#)
- [Спондилоартрит](#)

### Противопоказания:

- индивидуальная повышенная чувствительность к глюкозамину, лидокаина гидрохлориду и другим компонентам препарата;
- нарушения сердечной проводимости и острая сердечная недостаточность;
- эпилептиформные судороги в анамнезе;
- тяжелые нарушения функций печени и почек;
- период беременности и лактации;
- детский возраст до 12 лет.

*С осторожностью:* пациентам с хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипотонией. Следует соблюдать осторожность пациентам с аллергией на морепродукты (креветки, моллюски).

### Способ применения и дозы:

Внутримышечно! Препарат не предназначен для внутривенного введения. Перед использованием смешать раствор Б (растворитель) с раствором А (раствор препарата) в одном шприце. Приготовленный раствор препарата вводят внутримышечно по 3 мл (растворы А + Б) 3 раза в неделю на протяжении 4-6 недель. Инъекции препарата можно сочетать с приемом препарата внутрь в порошке для приготовления раствора для приема внутрь (пакетики). Продолжительность и схему лечения назначает лечащий врач.

### Побочное действие:

Переносимость препарата хорошая.

В отдельных случаях возможны: метеоризм, диарея, запор, аллергические реакции - крапивница, зуд.

Из-за содержания в препарате лидокаина возможны: тошнота, рвота, сонливость, диплопия, головная боль, головокружение, онемение языка и слизистой оболочки рта, тремор, эйфория, дезориентация, нарушение сердечной проводимости.

### Передозировка:

## **ДОНА (раствор)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Случаи передозировки не отмечены.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано в период беременности и лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Совместим с НПВС, парацетамолом и глюкокортикостероидами.

Следует соблюдать осторожность при назначении инъекций препарата в сочетании с бета-адреноблокаторами, дигитоксидом, аймалином, амнодароном, верапамилом, хинидином, новокаиномидом, гексеналом или тиопенталом натрия, ингибиторами МАО, полимиксином-В, снотворными или седативными средствами, циметидином.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При использовании препарата у пациентов с нарушенной толерантностью глюкозы, с выраженной печеночной и почечной недостаточностью необходим врачебный контроль.

#### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказано при тяжелых нарушениях функций почек.

#### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказано при тяжелых нарушениях функций печени.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано детям до 12 лет.

### **Условия хранения:**

При температуре не выше 25°C. Хранить в местах, недоступных для детей.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Dona\\_rastvor](http://drugs.thead.ru/Dona_rastvor)