

[Доналгин](#)



Код АТХ:

- [M01AX02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нифлумовая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее действие. Механизм действия связывают с ингибированием синтеза простагландинов. Подавляет агрегацию тромбоцитов.

Показания к применению:

Суставной синдром: ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагра.

Заболевания мягких тканей опорно-двигательного аппарата: бурсит, тендинит, тендовагинит, эпикондилит.

Травмы: переломы, вывихи, ушибы, суставные боли, встречающиеся в спортивной медицине, периоститы, повреждения мягких тканей.

Послеоперационные состояния: экстракция зуба, акушерско-гинекологические вмешательства, введение и удаление внутриматочных контрацептивов.

Гинекология: аднексит, параметрит.

Оториноларингология: синусит, ринит, фаринголарингит, средний отит.

Неврология: люмбаго.

Прочие: гингивостоматит, острый поверхностный тромбофлебит, язва голени.

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Бурсит](#)
- [Вывих](#)
- [Вывихи](#)
- [Гингивит](#)
- [Люмбаго](#)
- [Остеоартрит](#)
- [Остеоартроз](#)
- [Отит](#)
- [Параметрит](#)
- [Подагра](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)
- [Тендинит](#)
- [Тендовагинит](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Ушиб](#)
- [Ушибы](#)
- [Фарингит](#)
- [Эпикондилит](#)
- [Язва](#)

Противопоказания:

Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; тяжелые нарушения функции печени и/или почек; кровотечения из ЖКТ; аллергические реакции, связанные с приемом салицилатов в анамнезе; беременность; период лактации; детский возраст до 13 лет; повышенная чувствительность к нифлумовой кислоте.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь разовая доза для взрослых составляет 250-500 мг, суточная доза - 0.75-1 г; частоту приема и длительность лечения устанавливают индивидуально. Для детей старше 13 лет суточная доза составляет 500-750 мг.

Побочное действие:

Возможно: диспептические симптомы, анорексия; при длительном применении - язвенные поражения желудка и/или двенадцатиперстной кишки, мелена.

Редко: аллергические реакции в виде крапивницы, эритемы с зудом, транзиторное повышение уровня печеночных трансаминаз.

В отдельных случаях после нескольких лет лечения высокими дозами - костный флюороз.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нифлумовая кислота может усиливать действие пероральных антикоагулянтов и гепарина.

При одновременном применении с лития карбонатом описан случай интоксикации литием.

Особые указания и меры предосторожности:

Доналгин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

С особой осторожностью следует применять у пациентов с язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, при гастритах, энтеритах, колитах, при наличии сопутствующих заболеваний печени и/или почек, а также при наличии в анамнезе сведений о кровотечениях из ЖКТ.

Не рекомендуют применять одновременно ацетилсалициловую кислоту и другие НПВС, ГКС, антикоагулянты, тиклопидин, препараты лития, метотрексат, пероральные гипогликемические препараты.

В случае длительного применения необходимо проводить периодический контроль показателей функции печени и почек, а также картины периферической крови.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек. С особой осторожностью следует применять у пациентов при наличии сопутствующих заболеваний почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени. С особой осторожностью следует применять у пациентов при наличии сопутствующих заболеваний печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 13 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Donalgin>