# Доппельгерц Кардиовитал

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Таблетки, покрытые оболочкой,*** коричневого цвета с темными вкраплениями, круглые, двояковыпуклые; оболочка прозрачная.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| сухой экстракт листьев с цветками боярышника | 300 мг |

*Вспомогательные вещества:* лактозы моногидрат, целлюлоза порошкообразная, кремния диоксид высокодисперсный, коповидон, глицериды высокоцепочечные, повидон, крахмал кукурузный, натрия кроскармеллоза, тальк, магния стеарат.

*Состав оболочки:* шеллак, кополимер метакриловой кислоты-этакрилата (1:1), натрия додецилсульфат, полисорбат 80, макрогол 6000, тальк, эмульсия симетикона.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Кардиотонический препарат растительного происхождения. Оказывает умеренное кардиотоническое действие, улучшая работу сердечной мышцы. Обладает спазмолитическими свойствами. Избирательно расширяя коронарные сосуды и сосуды головного мозга, оказывает гипотензивное действие, способствует нормализации венозного давления. Проявляет седативные свойства.

***Фармакокинетика***

Данные о фармакокинетике препарата Доппельгерц Кардиовитал не предоставлены.

## Показания к применению:

— в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности I и II функциональных классов по классификации NYHA.

## Относится к болезням:

- Сердечная недостаточность

## Противопоказания:

— детский возраст;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1 таб. 2-3 раза/сут. Курс лечения - 6 недель. При необходимости проводят повторные курсы.

## Побочное действие:

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* при длительном применении в высоких дозах - брадикардия, артериальная гипотензия.

*Аллергические реакции:* в отдельных случаях - крапивница, зуд.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Доппельгерц Кардиовитал не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Доппельгерц Кардиовитал противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении боярышника и сердечных гликозидов (строфантин, дигоксин) происходит усиление кардиотонического действия.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Kardiovital