Доппельгерц Кардиовитал



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой, коричневого цвета с темными вкраплениями, круглые, двояковыпуклые; оболочка прозрачная.

	1 таб.
сухой экстракт листьев с цветками боярышника	300 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза порошкообразная, кремния диоксид высокодисперсный, коповидон, глицериды высокоцепочечные, повидон, крахмал кукурузный, натрия кроскармеллоза, тальк, магния стеарат.

Состав оболочки: шеллак, кополимер метакриловой кислоты-этакрилата (1:1), натрия додецилсульфат, полисорбат 80, макрогол 6000, тальк, эмульсия симетикона.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Кардиотонический препарат растительного происхождения. Оказывает умеренное кардиотоническое действие, улучшая работу сердечной мышцы. Обладает спазмолитическими свойствами. Избирательно расширяя коронарные сосуды и сосуды головного мозга, оказывает гипотензивное действие, способствует нормализации венозного давления. Проявляет седативные свойства.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Доппельгерц Кардиовитал не предоставлены.

Показания к применению:

— в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности I и II функциональных классов по классификации NYHA.

Относится к болезням:

- Сердечная недостаточность

Противопоказания:

— детский возраст;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1 таб. 2-3 раза/сут. Курс лечения - 6 недель. При необходимости проводят повторные курсы.

Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: при длительном применении в высоких дозах - брадикардия, артериальная гипотензия.

Аллергические реакции: в отдельных случаях - крапивница, зуд.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Доппельгерц Кардиовитал не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Доппельгерц Кардиовитал противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении боярышника и сердечных гликозидов (строфантин, дигоксин) происходит усиление кардиотонического действия.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Kardiovital