# Доппельгерц Мелисса



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

## Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь и наружного применения*** в виде прозрачной, бесцветной жидкости с пряным запахом и пряным обжигающим вкусом.

| | **100 мл** |
|---|---|
| листья мелиссы | 2 г |
| корень дягиля аптечного | 500 мг |
| кора корицы | 250 мг |
| орех мускатный | 300 мг |
| кора померанца | 1 г |
| гвоздика | 300 мг |
| кожура цитрусовых | 1.5 г |

*Вспомогательные вещества:* этанол 96% (содержание этанола в препарате составляет около 71%), вода очищенная.

15 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
50 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.
100 мл - флакон-капельницы (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Фитопрепарат. При приеме внутрь оказывает седативное, спазмолитическое действие, способствует усилению секреторной функции органов пищеварения. При наружном применении оказывает местнораздражающее действие.

## Показания к применению:

**Для приема внутрь**

— нарушения сна;

— повышенная нервная возбудимость;

— функциональные расстройства ЖКТ (для улучшения пищеварения).

**Для наружного применения**

— головная боль;

— боли в суставах и мышцах после физической нагрузки;

— ревматические боли.

## Относится к болезням:

- Боли в суставах
- Ревматизм

## Противопоказания:

— заболевания печени;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— хронический алкоголизм;

— эпилепсия;

— заболевания ЦНС;

— детский возраст;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повреждения кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата (для наружного применения);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата и к перуанскому бальзаму

## Способ применения и дозы:

При *повышенной нервной возбудимости* препарат принимают 1-2 раза/сут по 1-2 чайной ложке (30-60 капель) с сахаром или глюкозой или разводят в двойном количестве воды.

При *нарушениях сна* следует принимать в той же дозе перед сном.

При *нарушениях пищеварения* препарат назначают по 1-2 чайной ложке (30-60 капель) 1-2 раза/сут. Перед приемом следует разбавить в двойном количестве воды.

При *головной боли* препарат втирают в височную область, при *болях в мышцах или в суставах* - в соответствующие болезненные участки. При наружном применении препарат не разбавляют.

## Побочное действие:

*Иногда:* аллергические реакции (в т.ч. покраснение кожи), связанные с входящей в состав препарата корой корицы, фотосенсибилизация (связанная с корнем дягиля аптечного и корой померанца), более выраженная у предрасположенных пациентов (со светлой кожей). При УФ-облучении возможен дерматит.

## Передозировка:

Данные по передозировке препарата не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

1 чайная ложка соответствует 30 каплям препарата (такое соотношение выполняется только при использовании пробки-капельницы флакона).

Препарат содержит 71 об.% этанола. При применении препарата в рекомендуемых дозах следует учитывать, что в 2 чайных ложках (средняя разовая доза) содержится 6.35 г этанола.

При применении препаратов, содержащих корень дягиля аптечного, следует избегать длительного пребывания на солнце и интенсивного УФ-облучения.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При применении препарата возможно снижение скорости психомоторных реакций, что следует учитывать пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности.

***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при заболеваниях печени.

***Применение в детском возрасте***

Препарат противопоказан в детском возрасте.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

*Условия отпуска из аптек*

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

## Срок годности:

3 года.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Melissa