# Доппельгерц Нервотоник



## Код АТХ:

- A13A

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Зверобоя продырявленного травы экстракт

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

## Форма выпуска:

◊ ***Эликсир*** в виде жидкости красновато-коричневого цвета; в процессе хранения возможно образование небольшого осадка или помутнения.

| | **100 мл** |
|---|---|
| жидкий экстракт травы зверобоя | 2.084 г |

*Вспомогательные вещества:* концентрат вишневого ликера - 573 мг, вино ликерное - 101.543 г.

250 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат растительного происхождения. Оказывает седативное и антидепрессивное действие. Основные активные вещества зверобоя положительно влияют на функциональное состояние центральной и вегетативной нервной системы, что улучшает настроение, повышает психическую и физическую активность, нормализует сон.

***Фармакокинетика***

Действие препарата Доппельгерц Нервотоник является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

## Показания к применению:

— психовегетативные расстройства (сопровождающиеся снижением настроения, апатией, астенией);

— состояния тревоги и беспокойства;

— невротические реакции;

— депрессивные состояния легкой и средней степени тяжести.

## Относится к болезням:

- Астения
- Депрессия
- Неврит
- Неврозы

## Противопоказания:

— депрессии тяжелой степени;

— фотосенсибилизация при приеме препаратов зверобоя в анамнезе;

— детский возраст до 12 лет;

— повышенная чувствительность к препарату.

С *осторожностью* следует назначать препарат при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь по 20 мл 3 раза/сут после еды и перед сном регулярно в течение 6-8 недель.

При необходимости возможно назначение повторных курсов применения препарата.

Пациент должен быть предупрежден о необходимости обратиться к врачу при отсутствии улучшения состояния после проведенного лечения.

## Побочное действие:

*Редко:* диспепсия, аллергические реакции, реакции фотосенсибилизации (преимущественно у пациентов со светлой кожей).

## Передозировка:

До настоящего времени данных о передозировке препаратов зверобоя нет. При приеме препарата в очень высокой дозе возможно усиление побочных эффектов.

*Лечение:* отмена препарата, прием активированного угля; при необходимости - врачебный контроль состояния пациента. Следует избегать пребывания на солнце в течение 1-2 недель.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат активирует микросомальное окисление (цитохром Р450), поэтому его следует с осторожностью назначать при одновременном применении с дигоксином, теофиллином, противосудорожными средствами, трициклическими антидепрессантами, избирательными ингибиторами обратного захвата серотонина, препаратами против мигрени

(триптаны), циклоспорином, индинавиром, резерпином.

При одновременном применении препарат может усиливать действие средств для общей анестезии и опиоидных анальгетиков.

Не рекомендован одновременный прием препарата с ингибиторами МАО.

Одновременный прием с другими фотосенсибилизирующими средствами может привести к усилению фотосенсибилизации.

Препарат может применяться с другими психотропными средствами.

## Особые указания и меры предосторожности:

На фоне приема препарата пациенты (особенно со светлой кожей) должны избегать длительного пребывания на солнце и УФ-облучения (в т.ч. посещения солярия).

Препарат содержит 18 об.% этанола. При соблюдении рекомендованных дозировок при каждом приеме препарата в организм поступает 2.8 г этанола, в максимальной суточной дозе препарата содержится 8.4 г этанола.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период приема препарата следует воздерживаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспечера и оператора).

***При нарушениях функции печени***

С *осторожностью* следует назначать препарат при заболеваниях печени.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Nervotonik