

## [Доппельгерц Нервотоник](#)



### Код АТХ:

- [A13A](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Зверобоя продырявленного травы экстракт](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

◇ **Эликсир** в виде жидкости красновато-коричневого цвета; в процессе хранения возможно образование небольшого осадка или помутнения.

	<b>100 мл</b>
жидкий экстракт травы зверобоя	2.084 г

*Вспомогательные вещества:* концентрат вишневого ликера - 573 мг, вино ликерное - 101.543 г.

250 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат растительного происхождения. Оказывает седативное и антидепрессивное действие. Основные активные вещества зверобоя положительно влияют на функциональное состояние центральной и вегетативной нервной системы, что улучшает настроение, повышает психическую и физическую активность, нормализует сон.

#### **Фармакокинетика**

Действие препарата Доппельгерц Нервотоник является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

### Показания к применению:

---

- психовегетативные расстройства (сопровождающиеся снижением настроения, апатией, астенией);
- состояния тревоги и беспокойства;
- невротические реакции;
- депрессивные состояния легкой и средней степени тяжести.

### Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Депрессия](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)

### Противопоказания:

- депрессии тяжелой степени;
- фотосенсибилизация при приеме препаратов зверобоя в анамнезе;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к препарату.

С *осторожностью* следует назначать препарат при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга.

### Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь по 20 мл 3 раза/сут после еды и перед сном регулярно в течение 6-8 недель.

При необходимости возможно назначение повторных курсов применения препарата.

Пациент должен быть предупрежден о необходимости обратиться к врачу при отсутствии улучшения состояния после проведенного лечения.

### Побочное действие:

*Редко:* диспепсия, аллергические реакции, реакции фотосенсибилизации (преимущественно у пациентов со светлой кожей).

### Передозировка:

До настоящего времени данных о передозировке препаратов зверобоя нет. При приеме препарата в очень высокой дозе возможно усиление побочных эффектов.

*Лечение:* отмена препарата, прием активированного угля; при необходимости - врачебный контроль состояния пациента. Следует избегать пребывания на солнце в течение 1-2 недель.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не рекомендуется применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат активирует микросомальное окисление (цитохром P450), поэтому его следует с осторожностью назначать при одновременном применении с дигоксином, теофиллином, противосудорожными средствами, трициклическими антидепрессантами, избирательными ингибиторами обратного захвата серотонина, препаратами против мигрени

## **Доппельгерц Нервотоник**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

(триптаны), циклоспорином, индинавиром, резерпином.

При одновременном применении препарат может усиливать действие средств для общей анестезии и опиоидных анальгетиков.

Не рекомендован одновременный прием препарата с ингибиторами МАО.

Одновременный прием с другими фотосенсибилизирующими средствами может привести к усилению фотосенсибилизации.

Препарат может применяться с другими психотропными средствами.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

На фоне приема препарата пациенты (особенно со светлой кожей) должны избегать длительного пребывания на солнце и УФ-облучения (в т.ч. посещения солярия).

Препарат содержит 18 об.% этанола. При соблюдении рекомендованных дозировок при каждом приеме препарата в организм поступает 2.8 г этанола, в максимальной суточной дозе препарата содержится 8.4 г этанола.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период приема препарата следует воздерживаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

***При нарушениях функции печени***

С осторожностью следует назначать препарат при заболеваниях печени.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Doppelgerc\\_Nervotonik](http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Nervotonik)