

Доппельгерц Женьшень



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Женьшень](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр^{МНН}](#) [Википедия^{МНН}](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, корпус белого цвета, крышечка оранжевого цвета; содержимое капсул - порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

	1 капс.
порошок корней женьшеня настоящего	180 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 55 мг, глицерид высокоцепочечный - 10 мг.

Масса содержимого капсулы - 245 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин - 47.55-58.12 мг, железа оксид желтый (E172) - 0.15-0.18 мг, железа оксид красный (E172) - 0.01-0.02 мг, титана диоксид (E171) - 0.91-1.2 мг, натрия лаурилсульфат - 0.07-0.09 мг, вода очищенная - 7.94-9.7 мг.

Масса оболочки капсулы - 56.6-69.3 мг.

Номинальная масса капсулы - 301.6-314.3 мг.

20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат общетонизирующего действия. Оказывает тонизирующее, общеукрепляющее и психостимулирующее действие. Повышает тонус сосудов, положительно влияет на обмен аминокислот, липидов, гистамина. Улучшает функциональную деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем. Повышает умственную и физическую работоспособность, а также адаптационную способность организма. Уменьшает вялость, сонливость, чувство усталости.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Доппельгерц Женьшень не предоставлены.

Показания к применению:

- астенический синдром;
- неврастенический синдром;
- длительное психическое и физическое переутомление;
- для повышения сопротивляемости организма к стрессовым ситуациям и неблагоприятным воздействиям внешней среды;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- для повышения работоспособности и концентрации внимания.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Неврит](#)

Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- повышенная нервная возбудимость;
- бессонница;
- эпилепсия;
- повышенная кровоточивость;
- лихорадка при острых инфекционных заболеваниях;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 капсулы 2 раза/сут (утром и днем) за 30-40 мин до приема пищи. Курс лечения - 35-40 дней. При необходимости проводят повторные курсы лечения (через 2-3 недели).

Капсулы принимают не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, тахикардия.

Со стороны ЦНС: головная боль, нервозность, бессонница.

Прочие: аллергические реакции, носовое кровотечение, гипогликемия.

Передозировка:

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление побочных действий.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Доппельгерц Женьшень усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в т.ч. кофеин, камфора).

При одновременном применении Доппельгерц Женьшень проявляет антагонизм при взаимодействии с препаратами, угнетающими ЦНС (противоэпилептические препараты, нейролептики, транквилизаторы, седативные препараты).

При одновременном применении Доппельгерц Женьшень усиливает действие гипогликемических препаратов.

При одновременном применении Доппельгерц Женьшень усиливает действие варфарина.

При одновременном применении Доппельгерц Женьшень повышает риск развития резистентности к "петлевым" диуретикам.

Особые указания и меры предосторожности:

Терапевтический эффект наблюдается через 2 недели приема препарата. Имеется выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно.

Не следует применять препарат во второй половине дня.

Следует учитывать, что, если слабость, усталость и снижение внимания наблюдаются более продолжительное время и вызваны неясными причинами, следует провести дополнительное медицинское обследование.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.д.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Zhenshen