

Доппельгерц Женьшень Актив



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe Горздрав Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Эликсир** в виде прозрачной жидкости темно-коричневого цвета, с ароматным запахом.

	100 мл
жидкий экстракт корня женьшеня	3243 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B ₆)	6.49 мг
никотинамид (вит. PP)	54 мг
кофеин	22 мг

Вспомогательные вещества: сахарный сироп 70%, мед, сахарный краситель (E150), ароматизатор (ароматическая настойка), пропиленгликоль, вино ликерное, этанол 96 об.%, натрия цитрата дигидрат.

20 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

250 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат общетонизирующего действия. Действие препарата определяется свойствами входящих в его состав компонентов.

Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав экстракта женьшеня, оказывает стимулирующее действие на ЦНС, повышает умственную и физическую работоспособность, оказывает общеукрепляющее действие.

Фармакокинетика

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания к применению:

- астенические состояния различной этиологии;
- повышенные физические и умственные нагрузки;
- период восстановления после перенесенных заболеваний;

— для повышения сопротивляемости организма к стрессовым ситуациям.

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)

Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- повышенная нервная возбудимость;
- острый период инфекционных заболеваний;
- судорожные состояния;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают внутрь по 15 мл (1 столовая ложка) 2 раза/сут в первой половине дня.

Курс лечения составляет 30-40 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Доппельгерц Женьшень Актив не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора) и является антагонистом средств, угнетающих ЦНС, в т.ч. барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Во избежании нарушений сна препарат не рекомендуется принимать во второй половине дня.

Следует учитывать, что 15 мл препарата (1 разовая доза) содержат 1.9 г этанола.

При назначении препарата больным сахарным диабетом, следует учитывать, что 15 мл препарата соответствуют 0.3 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

С осторожностью назначают препарат пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Doppelgerc_Zhenshen_Aktiv