

## Доритрицин



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензалкония хлорид](#)
- [Бензокаин](#)
- [Тиротрицин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [МНН](#) [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки для рассасывания** круглые, плоскоцилиндрической формы, с фаской, с маркировкой DORITHRICIN на одной стороне, белого цвета с мятным запахом.

	<b>1 таб.</b>
бензалкония хлорид	1 мг
бензокаин	1.5 мг
тиротрицин	0.5 мг

*Вспомогательные вещества:* сорбитол 871 мг, тальк 80 мг, повидон (поливидон К25) 10 мг, кармеллоза натрия 10 мг, сахарозы стеарат 20 мг, масло листьев мяты перечной 5 мг, натрия сахаринат 1 мг.

10 шт. - блистеры Ал/ПВХ (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комплексный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Бензокаин является местным анестезирующим средством, уменьшающим боль при глотании, которая часто сопровождается инфекционно-воспалительными процессами полости рта и горла.

Бензалкония хлорид является четвертичным аммониевым соединением, относится к катионовым сурфактантам, взаимодействует с липопротеидами и нарушает проницаемость клеточных мембран. Обладает антисептическими свойствами, активен в отношении грамположительных бактерий, оказывает фунгицидное действие на *Candida albicans* и некоторые липофильные вирусы.

Тиротрицин - антибиотик местного действия, представляет собой смесь антимикробных линейных и циклических полипептидов, выделенных на стадии ферментации *Brevibacillus brevis* Dudos, состоящий преимущественно из грамицидина и тироцидина. Тиротрицин действует бактерицидно, вызывая разрыв процессов фосфорилирования в цепи клеточного дыхания и разрушая мембраны бактериальных клеток. В связи с особым механизмом действия тиротрицина, отсутствующего у антибиотиков системного действия, перекрестная устойчивость к препарату не возникает.

## Доритрицин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### Фармакокинетика

Бензокаин малорастворим в воде, что обуславливает его медленную абсорбцию. Как и все эфирные производные пара-аминобензойной кислоты, расщепляется эстеразой в плазме крови и печени. В результате образуются пара-аминобензойная кислота и этиловый спирт, метаболизирующийся до ацетилкофермента А.

Пара-аминобензойная кислота подвергается конъюгации с глицином или выводится почками в неизменном виде.

Бензалкония хлорид практически не абсорбируется, не оказывает резорбтивного действия и выводится почками. Не обнаружено накопление вещества в тканях организма.

Тиротрицин - в связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике отсутствуют. Не влияет на кишечную микрофлору.

### Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, сопровождающиеся болевым синдромом:

- фарингит, ларингит, начальная стадия ангины;
- воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

### Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Болевой синдром](#)
- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Фарингит](#)

### Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- наследственная непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы;
- детский возраст до 6 лет.

### Способ применения и дозы:

Внутрь. Взрослым и детям старше 6 лет, медленно рассасывать в полости рта по 1 таблетке каждые 3 часа. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток. Курс лечения 7 дней. Увеличение курса терапии при необходимости - по рекомендации врача

### Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, редко - желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### Передозировка:

В рекомендованных дозах случаев передозировки не описано. Случайный прием больших доз Доритрицина может вызвать нарушения со стороны пищеварительной системы (тошнота, рвота, диарея). В таком случае необходимо промыть желудок, принять активированный уголь и обратиться к врачу.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата Доритрицин в период беременности и лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано случаев клинически значимого взаимодействия препарата Доритрицин с другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Информация для больных сахарным диабетом: в 1 таблетке препарата содержание углеводов составляет примерно 0,07 хлебных единиц (ХЕ).

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не влияет.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 6 лет.

## **Условия хранения:**

При комнатной температуре не выше 25°C в сухом, защищенном от свете месте.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Doritricin>