Дормиплант

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** синего цвета, круглые, гладкие; на изломе видны 2 слоя и ядро.

	1 таб.
сухой экстракт корня валерианы (4-5:1)	160 мг
сухой экстракт листьев мелиссы (4-6:1)	80 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный, кросповидон, сахароза, масло касторовое гидрогенизированное, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Состав оболочки: эудрагит L30D: поли (этилакрилат, метакриловая кислота), натрия додецилсульфат, полисорбат, макрогол 6000, тальк, кальция карбонат (Е170), натрия кармеллоза, сахароза, кремния диоксид коллоидный, повидон (К25), декстрозы сироп (сухое в-во 79.5%), полисорбат 80, гипромеллоза (5 мПз), гипромеллоза (15 Пз), макрогол 1000, титана диоксид (Е171), пигмент на основе индигокармина (Е132).

Полировка: воск карнаубский.

25 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
25 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный фитопрепарат. Оказывает седативное действие.

Фармакокинетика

Действие препарата Дормиплант является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

— повышенная нервная возбудимость;

— нарушения засыпания.

Противопоказания:

— печеночная недостаточность;

— детский возраст до 6 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *повышенной нервной возбудимости* **взрослым и детям старше 6 лет** назначают по 2 таб. 2 раза/сут утром и вечером.

При *нарушениях засыпания* **взрослым и детям старше 6 лет** назначают по 2 таб. за 30 мин до сна.

Время приема препарата не зависит от времени приема пищи.

Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Дормиплант не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием до настоящего времени достаточных исследований препарат Дормиплант не рекомендуется назначать при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Дормиплант усиливает действие этанола, снотворных и других лекарственных средств, угнетающих ЦНС, что может потребовать коррекции доз.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять препарат более 1.5-2 мес ежедневно.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат может снижать скорость психомоторных реакций, поэтому не рекомендуется назначать Дормиплант непосредственно перед началом управления транспортными средствами или работой с механизмами.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Dormiplant