

Драмина



Код АТХ:

- [R06AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Дименгидринат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[PLS VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки** белого цвета, круглые, плоские, с фасками и риской на одной стороне.

	1 таб.
дименгидринат	50 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, повидон, кросповидон.

5 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, применяемый при кинетозах. Блокирует гистаминовые H₁-рецепторы и м-холинорецепторы ЦНС. Угнетает

Драмина

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

вестибулярную стимуляцию, действуя в первую очередь на отолиты; в высоких дозах оказывает действие на полукружные каналы. Оказывает противорвотное, анорексигенное, седативное, умеренное противоаллергическое действие, устраняет головокружение.

Начало действия препарата отмечается через 15-30 мин и сохраняется в течение 3-6 ч после приема.

Фармакокинетика

Всасывание и распределение

После приема препарата внутрь дименгидринат хорошо абсорбируется из ЖКТ и распределяется по органам и тканям. В малых количествах выделяется с грудным молоком.

Выведение

Практически полностью выводится из организма с мочой в течение 24 ч.

Показания к применению:

- кинетозы (морская и воздушная болезнь);
- профилактика и лечение симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений (головокружение, тошнота, рвота), за исключением симптомов, вызванных противоопухолевой терапией;
- болезнь Меньера.

Относится к болезням:

- [Воздушная болезнь](#)
- [Головокружение](#)
- [Рвота](#)
- [Тошнота](#)

Противопоказания:

- эпилепсия;
- острые экссудативный и герпетический (везикулярный) дерматозы;
- детский возраст до 1 года;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет назначают препарат по 50-100 мг 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза не должна превышать 350 мг.

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет препарат назначают по 12.5-25 мг 2-3 раза/сут, **от 7 до 12 лет** – по 25-50 мг 2-3 раза/сут.

Препарат принимают до еды.

Для профилактики кинетозов следует принять 50-100 мг за 30 мин до поездки.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, сонливость, общая слабость, усталость, нарушение концентрации внимания, беспокойство, нервозность, бессонница; редко - ослабление ночного и цветового зрения, нарушение аккомодации.

Драмина

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, снижение аппетита, тошнота, рвота.

Со стороны дыхательной системы: сухость слизистых оболочек носа, сгущение бронхиального секрета.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение АД, тахикардия.

Аллергические реакции: кожная сыпь, ангионевротический отек, бронхоспазм, лекарственный дерматит.

Прочие: гемолитическая анемия, затруднение мочеиспускания.

Передозировка:

Симптомы: сухость во рту, в носу и горле, покраснение лица, замедленное и затрудненное дыхание, спутанность сознания; у детей - судороги, галлюцинации.

Лечение: промывание желудка взвесью активированного угля (20-30 г), назначение солевого слабительного (10-15 г натрия сульфата), симптоматическая терапия; при судорогах у детей - фенobarбитал (в дозе из расчета 5-6 мг/кг), диазепам.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Драмина противопоказан к применению при беременности.

При необходимости применения Драмина в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Драмина усиливает эффекты атропина, трициклических антидепрессантов, катехоламинов, барбитуратов, алкоголя, седативных и снотворных средств, нейролептиков.

При совместном применении Драмина ослабляет действие ГКС и антикоагулянтов.

Драмина уменьшает депрессивное действие ацетилхолина на сердечную мышцу.

Совместное применение Драмина с препаратами висмута, скополамином, анальгетиками и психотропными средствами повышает вероятность нарушений зрения.

Препарат несовместим с антибиотиками, оказывающими ототоксическое действие (стрептомицин, неомицин, виомицин, амикацин, канамицин), т.к. может маскировать симптомы ототоксичности и способствовать развитию необратимого нарушения слуха.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью назначают Драмину пациентам с судорожным синдромом, при закрытоугольной глаукоме, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, пациентам с бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, при стенозирующих пептических язвах, пилородуоденальном стенозе, обструкции шейки мочевого пузыря.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

С осторожностью следует назначать препарат пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности (в т.ч. вождением автотранспорта), требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Детям старше 12 лет назначают препарат по 50-100 мг 2-3 раза/сут. Максимальная суточная доза не должна превышать 350 мг.

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет препарат назначают по 12.5-25 мг 2-3 раза/сут, **от 7 до 12 лет** - по 25-50 мг 2-3 раза/сут.

Препарат противопоказан **детям до 1 года**.

Драмина

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Dramina>