

## Драполен



### Код АТХ:

- [D08AJ](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Крем для наружного применения** однородный, розового цвета.

	<b>1 г</b>
бензалкония хлорид	100 мкг
цетримид	2 мг

*Вспомогательные вещества:* парафин мягкий белый - 100 мг, ланолин безводный - 20 мг, цетиловый спирт - 50 мг, поливакс GP200 - 50 мг, хлоркрезол - 1 мг, кармозин (E122) - 0.02 мг, вода очищенная - до 1000 мг.

55 г - тубы ламинированные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Антисептик комбинированного состава для наружного применения. Активные компоненты препарата - бензалкония хлорид и цетримид - являются четвертичными аммониевыми соединениями.

Оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие.

Препарат обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных бактерий, в меньшей степени -

## Драполен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

в отношении грамотрицательных бактерий. Не активен в отношении кислотоустойчивых бактерий и спор бактерий.

### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

### Показания к применению:

— профилактика и лечение пеленочного дерматита;

— в качестве средства первой помощи при легких повреждениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины и солнечные ожоги).

### Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Ожоги](#)
- [Порезы](#)
- [Царапины](#)

### Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Препарат предназначен только для наружного применения.

#### *Пеленочная сыпь у детей с грудного возраста*

Перед применением препарата следует вымыть и высушить пораженную область.

Для *лечения* при появлении первых признаков дерматита (покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи) крем наносят 3 или более раз в сутки, по мере необходимости, обычно при любой смене пеленок (подгузников, памперсов).

С целью *профилактики* наносят на кожу, покрываемую пеленками или подгузниками (памперсами), особенно перед сном, когда ребенок может долгое время находиться в мокрых пеленках (подгузниках).

#### *Порезы, царапины и солнечные ожоги*

Крем наносят тонким слоем, при необходимости накладывают марлевую повязку.

Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения

### Побочное действие:

При повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций.

### Передозировка:

Неизвестно.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о применении препарата при беременности и в период лактации не предоставлены.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Мыло и аниононовые сурфактанты снижают эффективность препарата.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не допускать попадания препарата в глаза.

Если сыпь не исчезает в течение 48-72 ч, необходимо обратиться к врачу.

Крем не следует наносить на инфицированные кожные покровы с нарушением их целостности.

### ***Применение в детском возрасте***

Применение возможно согласно режиму дозирования.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать после истечения срока годности.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Drapolen>