Драполен



Код АТХ:

- D08AJ

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем для наружного применения*** однородный, розового цвета.

	1 г
бензалкония хлорид	100 мкг
цетримид	2 мг

Вспомогательные вещества: парафин мягкий белый - 100 мг, ланолин безводный - 20 мг, цетиловый спирт - 50 мг, поливакс GP200 - 50 мг, хлоркрезол - 1 мг, кармозин (E122) - 0.02 мг, вода очищенная - до 1000 мг.

55 г - тубы ламинированные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептик комбинированного состава для наружного применения. Активные компоненты препарата - бензалкония хлорид и цетримид - являются четвертичными аммониевыми соединениями.

Оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие.

Препарат обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных бактерий, в меньшей степени -

в отношении грамотрицательных бактерий. Не активен в отношении кислотоустойчивых бактерий и спор бактерий.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Показания к применению:

— профилактика и лечение пеленочного дерматита;

— в качестве средства первой помощи при легких повреждениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины и солнечные ожоги).

Относится к болезням:

- Дерматит
- Ожоги
- Порезы
- Царапины

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен только для наружного применения.

Пеленочная сыпь у **детей с грудного возраста**

Перед применением препарата следует вымыть и высушить пораженную область.

Для *лечения* при появлении первых признаков дерматита (покраснения, опрелости или небольшого раздражения кожи) крем наносят 3 или более раз в сутки, по мере необходимости, обычно при любой смене пеленок (подгузников, памперсов).

С целью *профилактики* наносят на кожу, покрываемую пеленками или подгузниками (памперсами), особенно перед сном, когда ребенок может долгое время находиться в мокрых пеленках (подгузниках).

Порезы, царапины и солнечные ожоги

Крем наносят тонким слоем, при необходимости накладывают марлевую повязку.

Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения

Побочное действие:

При повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка:

Неизвестно.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о применении препарата при беременности и в период лактации не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Мыло и анионовые сурфактанты снижают эффективность препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Не допускать попадания препарата в глаза.

Если сыпь не исчезает в течение 48-72 ч, необходимо обратиться к врачу.

Крем не следует наносить на инфицированные кожные покровы с нарушением их целостности.

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Drapolen